

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
揭东县白塔镇桐联村	淹育型	杂优2068	25.5	79.7	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.7	13.1	正常	0.0	1.1
揭东县桂岭镇港尾村	淹育型	竹香粘	20.8	75.8	4.9	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	58.8	12.6	正常	0.0	2.0
揭东县桂岭镇赤步村	淹育型	野香优2号	20.5	75.1	9.7	0.3	0.0	8.9	0.5	0.0	51.6	13.2	正常	0.0	1.4
海丰县梅陇镇永红村	淹育型	香雪	22.3	76.5	4.6	0.1	0.0	4.5	0.0	0.0	45.7	13.2	正常	0.0	1.0
海丰县赤坑镇青坑村	淹育型	香雪	23.2	78.6	4.3	0.3	0.0	4.0	0.0	0.0	52.2	12.9	正常	0.0	0.3
海丰县赤坑镇社尾村	淹育型	丰隆	19.1	78.0	2.1	0.4	0.0	1.4	0.3	0.0	54.0	12.7	正常	0.0	0.3
海丰县陶河镇雅脚村	淹育型	香雪	25.8	76.6	4.9	3.6	0.0	1.3	0.0	0.0	58.2	11.6	正常	0.0	0.3
陆丰市潭西镇崔陂村	淹育型	珍桂	21.8	76.5	5.6	3.9	0.0	1.1	0.6	0.0	47.7	11.5	正常	0.0	0.7
陆丰市潭西镇德炉村	淹育型	珍桂	21.6	76.0	6.7	3.1	0.0	3.1	0.5	0.0	50.2	12.2	正常	0.0	0.4
陆丰市星都经济开发区棋子埔村	淹育型	珍桂	20.7	77.3	5.1	3.7	0.0	1.4	0.0	0.0	52.5	12.2	正常	0.0	0.6
陆丰市星都经济开发区龙江兰村	淹育型	珍桂	21.7	76.4	4.2	2.9	0.0	1.3	0.0	0.0	47.3	12.3	正常	0.0	0.9
新会区双水镇东陵村	潜育型	华泉	22.8	78.1	2.0	0.4	0.0	1.6	0.0	0.0	61.4	12.7	正常	0.0	0.9
新会区罗坑镇芦冲村	潜育型	金龙丝苗	18.7	76.0	3.1	0.3	0.0	0.8	2.0	0.0	45.3	12.4	正常	0.0	0.5
新会区古井镇南朗、长沙	潜育型	野香粘	18.1	78.6	2.8	0.2	0.0	1.9	0.7	0.0	65.2	12.1	正常	0.0	0.5
新会区沙堆镇	潜育型	莉香粘	23.1	78.1	5.0	0.0	0.0	4.8	0.2	0.0	57.3	12.4	正常	0.0	1.5
新会区司前镇新建村	潜育型水稻土	莉香粘	20.9	77.8	1.7	0.2	0.0	1.3	0.2	0.0	54.7	11.9	正常	0.0	0.5
台山市大江镇陈边镇	渗育型	金香	22.2	75.5	5.4	0.2	0.0	5.1	0.1	0.0	45.1	11.5	正常	0.0	0.2
台山市大江镇水楼村	渗育型	金香	21.5	76.2	4.1	0.3	0.0	3.2	0.6	0.0	46.6	11.9	正常	0.0	0.4
台山市大江镇大塘村	渗育型	金香	22.5	75.7	5.6	0.4	0.0	4.9	0.3	0.0	45.3	12.1	正常	0.0	0.3
台山市瑞芬镇海棠村	渗育型水稻土	香芽	18.9	75.3	3.0	0.9	0.0	1.6	0.5	0.0	50.6	13.1	正常	0.0	0.2
台山市瑞芬镇海阳村	渗育型水稻土	香芽	19.4	78.2	1.6	0.4	0.0	1.1	0.1	0.0	47.9	13.2	正常	0.0	0.2
台山市瑞芬镇香步村	渗育型水稻土	香芽	21.1	76.3	1.4	0.1	0.0	1.2	0.1	0.0	48.7	13.4	正常	0.0	0.0
台山市瑞芬镇那泰村	渗育型水稻土	香芽	21.4	78.4	1.7	0.3	0.0	1.3	0.1	0.0	46.7	13.4	正常	0.0	0.1
台山市瑞芬镇锦江村	渗育型水稻土	香芽	20.2	77.6	1.5	0.1	0.0	1.4	0.0	0.0	48.0	13.4	正常	0.0	0.1
鹤山市龙口镇五福村	潜育型	增香丝	20.0	75.8	3.2	0.6	0.0	2.6	0.0	0.0	48.4	11.9	正常	0.0	0.5
鹤山市龙口镇三凤村	潜育型	农晶	20.0	77.6	7.2	0.9	0.0	5.7	0.6	0.0	57.5	13.0	正常	0.0	0.4
沙溪镇龙山村	淹育型水稻土	象牙香占	21.2	75.9	6.4	0.1	0.0	5.5	0.8	0.0	52.6	8.9	正常	0.0	0.1
开平市蚬冈镇春山村	潜育型水稻土	新马占	32.1	79.1	2.3	0.4	0.0	1.9	0.0	0.0	44.7	10.2	正常	0.0	2.2

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
开平市蚬冈镇春山村	潞育型水稻土	19香	21.7	76.4	9.7	0.6	0.0	8.1	1.0	0.0	44.8	7.9	正常	0.0	1.4
开平市蚬冈镇春山村	潞育型水稻土	珍桂	21.7	77.1	5.0	1.9	0.0	2.5	0.6	0.0	58.0	9.5	正常	0.0	1.4
开平市蚬冈镇春山村	潞育型水稻土	长黄	21.5	75.4	6.8	0.0	0.0	6.4	0.4	0.0	50.2	9.7	正常	0.0	1.7
开平市蚬冈镇	潞育型水稻土	银湖香粘	20.4	75.4	9.2	0.4	0.0	8.8	0.0	0.0	60.1	10.1	正常	0.0	0.3
朝阳区西庐镇西二村	淹育型水稻土	小珍珠	28.5	75.1	12.9	0.0	0.0	5.2	7.7	0.0	64.1	9.3	正常	0.0	1.0
朝阳区金灶镇破头村	淹育型水稻土	竹香	20.4	77.5	4.6	1.8	0.0	2.0	0.8	0.0	44.1	10.6	正常	0.0	1.8
朝阳区关埠镇玉一村	渗育型水稻土	杂优细粒	22.5	79.9	2.4	0.2	0.0	2.0	0.2	0.0	58.6	10.5	正常	0.0	0.6
恩平市君堂镇龙盛村	潞育型	桂野香粘	22.2	76.2	3.6	0.0	0.0	1.9	1.7	0.0	49.7	9.9	正常	0.0	1.3
恩平市君堂镇龙盛村	潞育型	野香优莉丝	21.5	76.5	5.8	2.8	0.0	0.1	2.9	0.0	54.8	9.4	正常	0.0	1.3
恩平市君堂镇龙盛村	潞育型	美香两优晶丝	20.1	76.0	4.4	0.4	0.0	4.0	0.0	0.0	49.2	8.2	正常	0.0	0.9
茂南区镇盛镇梅江村	潜育型	显香两优8号	21.1	80.3	2.9	1.6	0.0	1.0	0.3	0.0	49.8	7.5	正常	0.0	0.2
茂南区镇盛镇梅江村	潜育型	华盛顿京贵占	25.9	79.7	4.0	2.8	0.0	1.2	0.0	0.0	49.5	7.9	正常	0.0	1.6
茂南区镇盛镇乌石村	潜育型	新优1618	25.5	79.0	5.2	3.8	0.0	1.4	0.0	0.0	44.6	7.5	正常	0.0	0.2
云城区思劳镇三坑村	潞育型水稻土	杂优1179	21.0	75.2	7.1	5.3	0.0	1.8	0.0	0.0	44.4	13.2	正常	0.0	0.0
云城区思劳镇三坑村	潞育型水稻土	野香优莉丝	20.2	77.0	2.0	0.3	0.0	1.7	0.0	0.0	51.8	10.4	正常	0.0	0.7
云城区思劳镇三坑村	潞育型水稻土	八桂香	19.8	77.0	5.7	4.1	0.0	1.6	0.0	0.0	64.0	11.3	正常	0.0	0.4
云安区镇安镇公安村委新安围村	潞育型	野香优明月丝苗	18.5	77.9	4.0	2.0	0.0	0.8	1.2	0.0	48.2	9.7	正常	0.0	0.1
云安区镇安镇公安村委新安围村	潞育型	广8优金占	21.8	78.6	4.5	0.6	0.0	2.2	1.7	0.0	47.4	8.6	正常	0.0	0.4
云安区镇安镇公安村委新安围村	潞育型	泰丰优208	22.0	76.6	3.8	1.8	0.0	2.0	0.0	0.0	52.3	8.8	正常	0.0	0.1
罗定市船步镇船北村	潜育型	椰香优美丝	19.8	76.3	5.2	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	50.4	12.4	正常	0.0	0.7
罗定市罗平镇古勇村	潜育型	竹香粘	18.0	77.5	1.6	0.5	0.0	1.1	0.0	0.0	61.6	10.2	正常	0.0	0.8
罗定市围底镇城围村	潜育型	美香占	21.9	76.9	5.5	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	60.3	13.2	正常	0.0	1.0
新兴县太平镇罗陈村	潞育型水稻土	黄丝粘	20.5	75.8	2.9	1.6	0.0	1.3	0.0	0.0	53.2	12.6	正常	0.0	0.8
新兴县东成镇新塘村	潞育型水稻土	晚白	20.2	78.4	2.9	0.3	0.0	1.8	0.8	0.0	57.2	11.1	正常	0.0	0.2
新兴县太平镇悦塘村	潞育型水稻土	杂优165	20.7	78.4	4.0	1.4	0.0	2.2	0.4	0.0	57.1	12.2	正常	0.0	0.3
郁南县东坝镇大坪村	淹育型水稻土	广八优	22.5	75.1	10.3	0.4	0.0	9.1	0.8	0.0	54.5	10.3	正常	0.0	0.2
郁南县东坝镇大坪村	淹育型水稻土	太丰优	23.4	78.5	1.5	1.1	0.0	0.4	0.0	0.0	46.6	11.4	正常	0.0	0.5
东城镇周屋	潞育型水稻土	利香粘	23.6	75.9	5.3	0.0	0.0	2.0	3.3	0.0	55.5	13.3	正常	0.0	2.4

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
澄海区凤翔镇南港村	潜育型水稻土	未两优1号	22.1	79.1	5.2	0.6	0.0	3.1	1.5	0.0	45.4	13.3	正常	0.0	1.0
澄海区凤翔镇洲畔村	潜育型水稻土	好看两优8号	21.4	78.6	3.1	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	8.7	13.1	正常	0.0	0.4
澄海区莲下镇槐泽村	潜育型	Y两优281	22.0	79.8	4.9	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	63.7	13.4	正常	0.0	0.3
潮南区陇田镇大布洋村	渗育型	杂优1377	24.0	80.4	1.4	0.1	0.0	1.1	0.2	0.0	68.7	13.4	正常	0.0	0.4
潮南区陇田镇田四村	渗育型	杂优1378	23.5	80.1	0.7	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0	68.0	13.3	正常	0.0	0.1
潮南区井都镇双山村	渗育型	杂优248	31.0	79.9	2.3	0.1	0.0	1.5	0.7	0.0	62.3	13.4	正常	0.0	0.1
电白区电城镇江城村	潜育型	广8优郁香	20.1	77.2	4.8	0.2	0.0	2.2	2.4	0.0	50.0	13.4	正常	0.0	0.8
电白区电城镇江城村	潜育型	Y两优	19.9	76.8	3.6	0.2	0.0	1.7	1.7	0.0	46.8	13.3	正常	0.0	0.5
电白区电城镇江城村	潜育型	昌两优香多	29.3	77.7	8.3	0.1	0.0	3.2	5.0	0.0	51.3	13.4	正常	0.0	1.2
电白区电城镇珍珠园村	潜育型	珍桂	20.4	78.8	2.3	0.4	0.0	1.9	0.0	0.0	66.3	13.4	正常	0.0	0.0
电白区电城镇珍珠园村	潜育型	清优红1号	21.4	72.3	19.8	0.4	0.0	1.5	17.9	0.0	58.1	13.2	正常	0.0	0.0
电白区岭门镇夏蓝村	潜育型	珍桂	23.8	80.2	6.7	1.7	0.0	3.1	1.9	0.0	47.8	13.4	正常	0.0	0.1
电白区马踏镇马踏村	潜育型	珍桂	24.8	78.9	4.4	1.3	0.0	2.6	0.5	0.0	65.2	13.3	正常	0.0	0.1
高州市山美镇和坑村	潜育型	兴两优3089	20.9	79.0	9.0	0.7	0.0	7.4	0.7	0.0	61.8	13.2	正常	0.0	0.0
高州市山美镇和坑村	潜育型	兴两优3089	20.0	77.1	6.4	0.5	0.0	5.8	0.1	0.0	62.7	13.4	正常	0.0	0.1
高州市南塘镇杨岸村	潜育型	Y两优1378	22.7	79.1	2.3	0.2	0.0	1.9	0.2	0.0	57.0	13.4	正常	0.0	0.8
高州市南塘镇杨岸村	潜育型	Y两优1378	22.8	77.7	5.5	0.9	0.0	2.1	2.5	0.0	67.9	13.4	正常	0.0	0.9
高州市谢鸡镇破头村	潜育型	特优加早	25.2	78.0	6.3	0.6	0.0	1.9	3.8	0.0	61.8	13.3	正常	0.0	0.2
高州市谢鸡镇破头村	潜育型	籼优911	20.5	75.5	8.5	0.6	0.0	7.6	0.3	0.0	62.3	10.1	正常	0.0	0.3
高州市谢鸡镇破头村	潜育型	兴两优3089	20.9	75.9	7.0	1.3	0.0	5.7	0.0	0.0	62.3	10.1	正常	0.0	0.3
化州市良光镇豺岭村	潜育型水稻土	粉王	25.0	67.6	32.3	0.5	0.0	3.8	26.7	0.0	50.9	13.4	正常	0.0	0.6
化州市良光镇豺岭村	潜育型水稻土	珍桂矮	26.4	67.6	31.0	0.5	0.0	3.8	26.7	0.0	50.5	13.4	正常	0.0	0.5
化州市南盛镇东方红村	潜育型水稻土	珍桂矮	22.3	78.8	2.4	0.2	0.0	2.2	0.0	0.0	64.2	13.3	正常	0.0	2.1
化州市合江镇同志堡村	潜育型水稻土	珍桂矮	22.0	78.9	5.2	0.7	0.0	2.3	2.2	0.0	67.2	13.3	正常	0.0	1.3
化州市官桥镇上坡村	潜育型水稻土	珍桂矮	22.3	75.9	7.5	1.6	0.0	5.0	0.9	0.0	56.6	12.7	正常	0.0	1.7
化州市笪桥镇木威塘村	潜育型水稻土	粉王	24.6	67.4	33.1	0.6	0.0	2.7	29.8	0.0	49.1	13.1	正常	0.0	0.5
信宜市北界镇金渠村	潜育型水稻土	Y两优1173	20.8	77.4	7.7	0.2	0.0	3.0	4.5	0.0	44.1	13.4	正常	0.0	0.8
信宜市北界镇六葛村	潜育型水稻土	深两优898	24.1	77.2	6.7	0.3	0.0	3.8	2.6	0.0	27.0	10.2	正常	0.0	0.8

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
信宜市池洞镇石庆村	潞育型水稻土	Y两优香粘	22.5	78.0	5.9	0.2	0.0	1.4	4.3	0.0	45.5	13.4	正常	0.0	1.0
信宜市池洞镇东南村	潞育型水稻土	香油粘	23.3	76.0	11.9	0.0	0.0	2.8	9.1	0.0	47.2	13.4	正常	0.0	1.3
信宜市东镇栗木村	潞育型水稻土	Y两优602	23.8	77.5	4.4	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	47.4	13.3	正常	0.0	0.2
信宜市合水镇横水村	潞育型水稻土	广8优金粘	23.3	76.8	5.9	0.0	0.0	4.6	1.3	0.0	31.9	12.1	正常	0.0	0.1
信宜市合水镇新云村	潞育型水稻土	恒丰优778	23.1	78.5	7.1	0.8	0.0	6.3	0.0	0.0	55.7	11.8	正常	0.0	0.3
揭西县龙潭镇破尾村	淹育型	杂优	18.9	71.7	21.3	0.0	0.0	18.2	3.1	0.0	24.9	9.0	正常	0.0	0.5
揭西县五经富镇联和村	淹育型	大谷、小谷	17.2	76.8	6.2	0.1	0.0	5.2	0.9	0.0	53.9	11.8	正常	0.0	2.0
揭西县大溪镇井新村	淹育型	杂优	22.8	75.2	11.1	1.1	0.0	8.1	1.9	0.0	24.9	9.8	正常	0.0	0.1
揭西县龙潭镇破尾村	淹育型	杂优	18.2	78.0	4.6	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	24.4	8.8	正常	0.0	0.1
揭西县五经富镇联和村	淹育型	大谷、小谷	16.9	78.2	4.5	0.1	0.0	4.0	0.4	0.0	57.1	11.6	正常	0.0	0.2
揭西县大溪镇井新村	淹育型	杂优	22.2	76.6	9.1	0.1	0.0	7.5	1.2	0.0	17.2	10.0	正常	0.0	0.1
龙川县鹤市镇罗乐村	潞育型水稻土	五优金丝苗	25.0	73.8	13.3	2.3	0.0	5.7	5.3	0.0	59.8	13.2	正常	0.0	0.5
龙川县鹤市镇罗乐村	潞育型水稻土	泰丰优208	22.5	78.6	3.7	0.1	0.0	2.0	1.6	0.0	52.6	13.2	正常	0.0	0.8
龙川县龙母镇珠塘村	潞育型水稻土	泰丰优208	20.5	80.2	2.2	0.1	0.0	0.7	1.4	0.0	55.3	13.0	正常	0.0	0.1
龙川县龙母镇珠塘村	潞育型水稻土	青香优19香	22.6	78.0	3.7	0.3	0.0	3.3	0.1	0.0	36.3	13.3	正常	0.0	4.3
龙川县龙母镇珠塘村	潞育型水稻土	泰丰优736	21.9	77.9	5.5	0.5	0.0	2.0	3.0	0.0	56.5	13.0	正常	0.0	1.2
惠来县隆江镇山家村	潞育型	珍桂	22.3	79.0	3.1	1.2	0.0	1.9	0.0	0.0	66.7	13.1	正常	0.0	0.6
惠来县隆江镇犁头庵	潞育型	竹香	23.7	78.0	5.3	0.0	0.0	4.4	0.9	0.0	66.7	13.4	正常	0.0	0.3
榕城区地都镇钱前村	淹育型	长粒优	21.1	78.7	5.7	0.3	0.0	2.2	3.2	0.0	57.1	11.3	正常	0.0	0.4
榕城区地都镇钱前村	淹育型	短粒优	27.9	79.3	8.8	0.8	0.0	0.4	7.6	0.0	57.1	9.1	正常	0.0	0.4
陆河县东坑镇新东村	淹育型	泰丰优208	22.6	77.8	4.0	0.0	0.0	3.1	0.9	0.0	55.4	11.0	正常	0.0	0.2
饶平县高堂镇树下村	渗育型	杂优3089	22.5	78.7	3.7	0.0	0.0	3.1	0.6	0.0	54.5	10.4	正常	0.0	0.6
饶平县高堂镇树下村	渗育型	杂优898	22.1	77.3	3.3	1.2	0.0	2.0	0.3	0.0	59.7	11.7	正常	0.0	0.3
饶平县高堂镇吴厝寮	渗育型	杂优870	25.4	75.5	8.8	0.0	0.0	2.2	6.6	0.0	42.9	9.7	正常	0.0	0.1
饶平县钱东镇西港村	咸酸	Y两优133	19.1	78.8	4.5	0.2	0.0	2.8	1.5	0.0	56.9	13.2	正常	0.0	0.2
饶平县钱东镇西港村	咸酸	Y两优911	21.2	78.3	8.3	0.5	0.0	6.0	1.8	0.0	54.1	10.4	正常	0.0	0.9
饶平县钱东镇西港村	咸酸	Y两优321	20.6	77.4	9.3	0.0	0.0	5.3	4.0	0.0	55.1	12.5	正常	0.0	0.4
普宁市南径镇横山尾村	潞育型、潜育型	杂优712	25.7	79.1	4.4	0.6	0.0	2.1	1.7	0.0	33.1	9.0	正常	0.0	0.2

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
普宁市南径镇横山尾村	潞育型、潞育型	杂优143	26.9	79.8	4.0	0.4	0.0	2.6	1.0	0.0	32.4	12.0	正常	0.0	0.1
普宁市南径镇碧屿村	潞育型、潞育型	杂优808	26.3	79.3	4.8	1.1	0.0	5.8	0.9	0.0	33.6	11.1	正常	0.0	0.2
梅县白渡镇嵩灵村	潞育型	弘优3089	27.3	77.1	6.0	0.2	0.0	5.8	0.0	0.0	41.9	12.2	正常	0.0	0.7
梅县白渡镇凤岭村	潞育型	五优1179	24.7	76.8	8.8	0.6	0.0	6.8	1.4	0.0	28.0	11.1	正常	0.0	1.3
梅县水车镇小立村	潞育型	五优1179	23.3	75.5	10.6	1.6	0.0	5.7	3.4	0.0	51.2	11.9	正常	0.0	6.3
梅县水车镇梧塘村	潞育型	Y两优1378	23.8	77.1	7.0	0.0	0.0	6.1	0.9	0.0	48.4	11.8	正常	0.0	0.3
大埔县西河镇东塘村	潞育型	恒丰优	24.2	76.4	7.9	0.0	0.0	6.8	1.1	0.0	45.8	12.5	正常	0.0	0.5
大埔县三河镇梓里村	潞育型	美巴香占	23.1	76.9	5.2	0.0	0.0	3.2	2.0	0.0	38.9	11.9	正常	0.0	0.6
大埔县三河镇白石村	潞育型	Y两优133	24.3	78.7	5.5	0.3	0.0	4.6	0.6	0.0	59.2	13.4	正常	0.0	0.8
丰顺县潘田镇华亭村	潞育型	泰丰优208	24.7	78.4	6.0	1.8	0.0	4.2	0.0	0.0	55.8	13.4	正常	0.0	0.3
丰顺县丰良镇成东村	潞育型	恒丰优1179	20.1	79.5	3.6	0.2	0.0	3.3	0.1	0.0	44.9	13.4	正常	0.0	0.3
丰顺县丰良镇莘桥村	潞育型	天两优12	23.0	78.5	4.2	1.1	0.0	3.1	0.0	0.0	56.3	13.5	正常	0.0	0.4
五华县转水镇三源村	潞育型	恒丰优9802	26.1	79.4	4.3	0.0	0.0	3.1	1.2	0.0	32.4	11.9	正常	0.0	1.5
五华县转水镇下潭村	潞育型	泰优粤禾丝苗	22.6	76.9	10.4	0.0	0.0	1.3	9.1	0.0	53.6	13.2	正常	0.0	1.9
五华县横陂镇章联村	潞育型	剂优6377	26.0	77.3	7.6	0.2	0.0	0.6	6.8	0.0	44.6	10.5	正常	0.0	0.1
五华县横陂镇崇文村	潞育型	中智香优8号	21.2	78.2	6.8	0.9	0.0	2.3	3.6	0.0	38.8	13.1	正常	0.0	0.2
蕉岭县三圳镇招福村	潞育型	隆优3155	23.7	79.2	2.4	0.5	0.0	1.9	0.0	0.0	38.9	13.0	正常	0.0	0.1
蕉岭县新铺镇长江村	潞育型	隆优3155	23.4	77.1	5.9	1.3	0.0	3.3	1.3	0.0	57.2	13.0	正常	0.0	0.1
蕉岭县蕉城镇龙安村	潞育型	桂朝2号	27.5	79.0	3.7	0.4	0.0	3.1	0.2	0.0	65.5	13.3	正常	0.0	0.3
兴宁市宁中镇鸭桥村	潞育型	泰丰优208	21.6	78.4	3.6	1.7	0.0	1.9	0.0	0.0	61.9	13.2	正常	0.0	2.2
兴宁市宁中镇蔗塘村	潞育型	南晶香占	21.6	79.5	1.8	0.4	0.0	1.2	0.2	0.0	60.5	13.2	正常	0.0	2.2
兴宁市叶塘镇彭陂村	潞育型	19香	22.1	76.9	7.3	0.6	0.0	5.3	1.4	0.0	51.7	13.0	正常	0.0	1.4
兴宁市叶塘镇龙坪村	潞育型	黄华占	21.1	79.1	4.6	1.8	0.0	2.8	0.0	0.0	57.4	12.7	正常	0.0	1.5
平远县中行镇中行村	潞育型	泰丰优736	23.1	77.1	6.6	1.3	0.0	4.5	0.8	0.0	61.8	11.3	正常	0.0	4.0
平远县中行镇中行村	潞育型	两优887	22.7	77.9	4.4	1.3	0.0	3.1	0.0	0.0	49.1	11.8	正常	0.0	0.1
平远县河头镇向阳村	潞育型	恒丰优金丝苗	24.2	77.4	6.9	0.2	0.0	3.6	3.1	0.0	49.2	9.6	正常	0.0	0.6
平远县河头镇黄田村	潞育型	恒丰优金丝苗	20.9	76.4	9.9	0.2	0.0	2.2	7.5	0.0	50.1	11.1	正常	0.0	0.7
德庆县官圩镇五福村	潞育型	珍桂	24.3	76.9	4.7	2.2	0.0	0.6	1.9	0.0	55.3	10.7	正常	0.0	0.1

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
德庆县新圩镇历麻村	潜育型	特优608	23.4	77.4	6.7	2.6	0.0	3.0	1.1	0.0	52.3	11.5	正常	0.0	0.4
德庆县马圩镇上彭村	潜育型	金粘	19.6	77.1	6.6	2.2	0.0	3.2	1.2	0.0	53.7	10.8	正常	0.0	0.2
德庆县马圩镇上彭村	潜育型	杂优208	20.9	78.4	5.3	0.0	0.0	2.2	3.1	0.0	56.6	11.0	正常	0.0	1.1
封开县长岗村前程村	潜育	珍桂矮	20.2	77.5	6.6	0.0	0.0	2.2	4.4	0.0	59.3	11.4	正常	0.0	0.1
封开县长岗村前程村	潜育	特优608	28.3	77.5	5.3	0.1	0.0	2.7	2.5	0.0	56.6	11.6	正常	0.0	0.2
封开县长岗村前程村	潜育	珍桂矮	21.7	78.0	5.3	0.4	0.0	3.2	1.7	0.0	48.4	12.0	正常	0.0	0.2
封开县长岗村前程村	潜育	五优116	21.6	77.7	5.5	0.6	0.0	3.7	1.2	0.0	49.4	10.0	正常	0.0	0.2
封开县长岗村前程村	潜育	五优116	21.4	78.9	2.3	0.2	0.0	1.8	0.3	0.0	49.8	10.0	正常	0.0	0.6
高要区河台镇罗闪村	淹育	象牙粘	22.5	77.3	5.3	0.3	0.0	5.0	0.0	0.0	49.6	13.3	正常	0.0	0.3
高要区河台镇罗闪村	淹育	象牙粘	20.8	76.7	6.5	0.8	0.0	5.7	0.0	0.0	49.7	13.2	正常	0.0	0.2
高要区河台镇罗闪村	淹育	象牙粘	20.9	76.8	4.9	0.7	0.0	3.7	0.5	0.0	42.9	13.0	正常	0.0	0.1
高要区河台镇罗闪村	淹育	象牙粘	22.0	77.9	1.8	0.3	0.0	1.3	0.2	0.0	44.1	13.3	正常	0.0	0.4
广宁县南街镇红星村	潜育型水稻土	广8优金占	22.2	80.2	2.3	0.4	0.0	1.2	0.7	0.0	44.3	13.1	正常	0.0	0.1
广宁县南街镇红星村	潜育型水稻土	广8优粤禾丝苗	21.4	77.6	8.7	0.1	0.0	4.9	3.7	0.0	51.0	13.1	正常	0.0	0.1
广宁县南街镇富溪村	潜育型水稻土	兴两优3089	20.2	79.8	3.0	0.4	0.0	1.9	0.7	0.0	54.9	12.9	正常	0.0	0.8
广宁县南街镇富溪村	潜育型水稻土	美香两优晶丝	20.4	77.2	4.9	0.0	0.0	2.1	2.8	0.0	47.6	13.1	正常	0.0	1.0
怀集县梁村镇新寨村	潜育型	9516	22.5	80.3	4.0	0.1	0.0	2.1	1.8	0.0	40.8	10.0	正常	0.0	0.2
怀集县马宁镇塘岗富厢村	潜育型	龙优丝苗	24.0	76.6	10.2	0.3	0.0	8.0	1.9	0.0	30.8	11.8	正常	0.0	0.2
怀集县蓝钟镇谭或村	潜育型	泰丰优208	20.6	76.4	5.8	5.1	0.0	0.7	0.0	0.0	54.6	12.4	正常	0.0	0.2
怀集县岗坪镇睦渊村	潜育型	9516	23.8	79.6	1.2	0.4	0.0	0.8	0.0	0.0	24.8	10.1	正常	0.0	0.2
四会市江谷镇大垌苏坑村	潜育型	杂优	20.3	77.1	6.1	3.8	0.0	2.3	0.0	0.0	45.1	13.4	正常	0.0	0.5
四会市江谷镇大垌里田村	潜育型	杂优	20.3	75.3	6.8	1.7	0.0	3.1	2.0	0.0	45.1	13.5	正常	0.0	0.1
四会市江谷镇大垌村委里田村	潜育型	杂优	17.4	72.6	18.6	5.9	0.0	9.3	3.4	0.0	30.0	11.8	正常	0.0	0.1
四会市江谷镇大垌村委旧屋村	潜育型	杂优	20.9	77.3	7.1	1.1	0.0	4.0	2.1	0.0	44.5	10.1	正常	0.0	0.4
新丰县遥田镇旗寮村	潜育型	野香优莉丝	23.7	81.3	2.4	0.2	0.0	1.7	0.5	0.0	58.4	12.9	正常	0.0	1.0
新丰县沙田镇长引村	潜育型	广和优郁香	25.6	79.6	2.9	0.2	0.0	2.3	0.4	0.0	30.4	13.3	正常	0.0	0.5
始兴县沈所镇南方村	咸酸型	美香占2号	21.4	75.2	7.4	1.8	0.0	4.2	1.4	0.0	59.6	10.5	正常	0.0	0.1
始兴县顿岗镇围下村	咸酸型	白壳油占	18.3	77.1	6.4	1.3	0.0	3.7	1.4	0.0	63.8	11.7	正常	0.0	0.1

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
翁源县龙仙镇丰山村	渗育型	泰丰优208	21.5	79.5	1.1	0.2	0.0	0.9	0.0	0.0	52.4	12.9	正常	0.0	0.2
乐昌市廊田镇早禾田佰子塘村	淹育型	象牙粘	20.7	75.2	7.8	0.0	0.0	7.2	0.6	0.0	58.3	12.7	正常	0.0	0.2
仁化区扶溪镇后塘村	淹育型	蔡优208	21.8	76.2	4.5	1.3	0.0	3.2	0.0	0.0	47.6	9.7	正常	0.0	0.1
东源县漳溪镇漳溪村	潜育型	Y两优1173	20.9	78.9	5.3	0.2	0.0	5.1	0.0	0.0	41.8	10.6	正常	0.0	0.1
东源县船塘镇岭头村	潜育型	泰丰优	24.0	79.0	4.5	1.9	0.0	2.6	0.0	0.0	64.0	13.4	正常	0.0	0.4
东源县船塘镇岭头村		杂优	25.4	77.4	9.7	2.4	0.0	6.7	0.6	0.0	64.6	13.1	正常	0.0	0.2
东源县蓝口镇蓝口围村	潜育型	中升优101	20.8	75.9	7.1	1.1	0.0	5.8	0.2	0.0	60.0	10.1	正常	0.0	0.2
和平县彭寨镇墩史村	淹育型水稻土	野杂优	21.9	78.3	4.4	1.4	0.0	3.0	0.0	0.0	67.2	11.4	正常	0.0	0.1
和平县彭寨镇大圻面村	淹育型水稻土	深优918	19.4	77.8	4.8	0.9	0.0	3.2	0.7	0.0	68.7	12.9	正常	0.0	0.1
紫金县紫城镇石坑村	淹育型	Y两优1378	19.5	77.4	7.6	1.2	0.0	6.4	0.0	0.0	61.7	13.3	正常	0.0	0.2
紫金县龙窝镇双下村	淹育型	济优6377	26.8	78.4	3.0	0.6	0.0	2.4	0.0	0.0	62.0	10.2	正常	0.0	0.1
紫金县苏区镇黄布村	咸酸型	纳油6388	22.0	77.7	7.0	1.3	0.0	4.5	1.2	0.0	53.1	10.7	正常	0.0	0.7
连平县上坪镇旗石村	渗育型	丝苗	18.3	79.4	3.4	0.0	0.0	3.1	0.3	0.0	27.4	11.4	正常	0.0	0.1
连平县上坪镇旗石村	渗育型	泰丰优208	22.0	79.4	4.5	1.9	0.0	2.6	0.0	0.0	63.8	10.4	正常	0.0	0.2
连平县内莞镇横水（移民新村队）	渗育型	恒丰优777	21.5	78.4	1.8	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	54.2	9.6	正常	0.0	0.5
连平县内莞镇横水（塘子队）	渗育型	恒丰优778	27.3	79.0	5.4	0.7	0.0	4.7	0.0	0.0	51.8	9.4	正常	0.0	0.6
斗门区斗门镇大赤坎村	潜育型	金香	24.1	77.2	3.7	1.0	0.0	2.5	0.2	0.0	64.4	11.9	正常	0.0	0.2
斗门区莲洲镇西滘村	淹育型	美雪丝苗	21.1	76.5	5.0	0.3	0.0	4.1	0.6	0.0	63.8	11.1	正常	0.0	0.1
乳源县桂头镇均村	咸酸型	丰良优	19.6	75.7	7.5	1.9	0.0	5.6	0.0	0.0	58.9	11.6	正常	0.0	0.7
乳源县桂头镇松围村	咸酸型	谷优248	25.2	78.1	3.9	1.1	0.0	2.8	0.0	0.0	25.0	9.5	正常	0.0	0.2
南雄市珠玑镇下汾村	渗育型	南晶香粘	23.9	77.4	4.9	1.8	0.0	3.1	0.0	0.0	61.9	13.0	正常	0.0	1.0
阳春市八甲镇乔连村	潜育型	珍桂矮	22.8	72.4	14.8	0.0	0.0	14.0	0.8	0.0	46.7	10.0	正常	0.0	0.2
阳春市八甲镇枝根村	潜育型	海优168	22.0	77.5	8.0	0.2	0.0	6.1	1.7	0.0	53.8	10.1	正常	0.0	0.3
阳春市八甲镇大坡村	潜育型	Y两优1378	21.6	76.0	9.1	0.0	0.0	7.1	2.0	0.0	26.2	9.6	正常	0.0	0.1
阳春市八甲镇枝根村	潜育型	丝苗	24.4	76.7	4.9	0.7	0.0	3.2	1.0	0.0	57.7	9.1	正常	0.0	0.1
江城区双捷镇康州村	潜育型	香之	24.7	76.6	5.7	0.0	0.0	2.5	3.2	0.0	59.7	13.2	正常	0.0	3.7
江城区埠场镇那栋村	潜育型	香优	21.0	76.8	4.9	0.5	0.0	2.8	1.6	0.0	59.3	12.8	正常	0.0	0.3
江城区埠场镇那栋村	潜育型	玉桂	21.5	77.8	3.9	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	67.2	13.0	正常	0.0	0.2

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
阳西县程村镇平原村	潜育型	杂优	25.8	80.2	3.4	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	65.1	12.3	正常	0.0	0.2
阳西县溪头镇白土村	潜育型	细粒谷	18.2	75.9	6.0	0.0	0.0	5.7	0.3	0.0	69.0	12.9	正常	0.0	0.0
阳东区雅韶镇笏潮村	淹育型	珍桂	22.1	77.5	5.3	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	26.4	11.9	正常	0.0	1.9
阳东区塘坪镇潮观村	淹育型	象牙香	20.0	76.0	4.7	0.0	0.0	3.8	0.9	0.0	57.5	12.6	正常	0.0	0.3
阳东区合山镇那洋村	淹育型	广西早粘	21.2	75.7	7.3	0.0	0.0	4.6	2.7	0.0	61.2	13.0	正常	0.0	0.5
曲江区大塘镇西林村	潜育型	科龙	16.1	76.4	5.7	1.0	0.0	3.4	1.3	0.0	56.9	11.5	正常	0.0	0.5
曲江区樟市镇樟市村	潜育型	银粘	14.7	78.0	5.3	0.6	0.0	4.7	0.0	0.0	52.9	10.4	正常	0.0	0.2
增城区朱村镇龙岗村	潜育型	香丝苗	18.2	77.3	5.4	1.1	0.0	3.8	0.5	0.0	48.3	13.0	正常	0.0	0.3
增城区朱村镇丹邱村	潜育型	增新丝苗	20.3	74.2	11.8	0.3	0.0	9.0	25.0	0.0	22.5	12.8	正常	0.0	0.3
澄海区莲下镇海后村	潜育型	稻粘	27.1	77.1	8.5	0.1	0.0	2.2	6.2	0.0	48.9	10.3	正常	0.0	0.4
朝阳区西庐镇西一村	潜育型	深优9516	27.6	78.8	6.4	0.6	0.0	1.9	3.9	0.0	51.2	13.4	正常	0.0	0.3
朝阳区金灶镇大联村	淹育型	杂优524	29.6	71.6	21.3	0.0	0.0	2.2	19.1	0.0	59.8	13.2	正常	0.0	0.4
潮南区陇田镇高埔村	渗育型	竹香尖	22.7	77.4	4.1	0.0	0.0	3.2	0.9	0.0	59.6	13.2	正常	0.0	0.4
潮南区陇田镇仙家村	渗育型	杂优898	26.1	77.3	6.9	4.9	0.0	2.0	0.0	0.0	56.6	13.4	正常	0.0	0.0
曲江区白土镇大村	潜育型	黄壳粘	18.4	75.8	7.2	0.0	0.0	5.9	1.3	0.0	48.4	12.3	正常	0.0	0.6
始兴县顿岗镇	咸酸型	白壳油占	25.7	77.5	7.8	0.2	0.0	2.0	5.6	0.0	55.7	11.8	正常	0.0	0.2
仁化县扶溪镇古夏村	淹育型	深优9516	24.8	78.2	7.9	1.5	0.0	6.1	0.3	0.0	57.7	13.3	正常	0.0	2.5
仁化县长江镇里周村	淹育型	常规种78	20.9	77.2	5.0	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	56.4	12.0	正常	0.0	0.2
翁源县江尾镇联益村	渗育型	珍桂	20.6	77.5	5.7	1.8	0.0	3.9	0.0	0.0	61.8	12.1	正常	0.0	0.1
新丰县遥田镇竹岭村	潜育型	美香占	19.9	76.1	7.4	0.7	0.0	6.7	0.0	0.0	55.4	13.3	正常	0.0	0.8
新丰县梅坑镇利坑村	潜育型	泰丰优208	20.9	76.0	3.5	2.4	0.0	0.8	0.3	0.0	50.0	12.0	正常	0.0	0.1
乳源县一六镇坪山村	咸酸型	美香占	23.6	77.7	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	59.0	13.4	正常	0.0	0.2
乳源县桂头镇杨溪村	咸酸型	泰丰优208	21.9	78.1	7.1	0.8	0.0	6.3	0.0	0.0	64.7	13.4	正常	0.0	0.2
龙川县龙母镇珠塘村	潜育型	青香优19香	22.5	77.2	6.8	2.2	0.0	3.7	0.9	0.0	47.0	13.1	正常	0.0	1.8
龙川县龙母镇珠塘村	潜育型	泰丰优736	21.9	77.2	6.5	1.9	0.0	4.0	0.6	0.0	56.6	13.2	正常	0.0	0.5
东源县船塘镇龙江村	潜育型	广泰优	20.8	78.5	3.8	2.2	0.0	1.6	0.0	0.0	60.8	12.1	正常	0.0	0.2
东源县柳城镇上、下坝	潜育型	美巴香占	26.9	78.7	3.9	0.7	0.0	2.7	0.5	0.0	46.3	12.6	正常	0.0	0.3
东源县柳城镇上、下坝	潜育型	华航51	28.0	78.7	5.0	0.4	0.0	4.6	0.0	0.0	56.4	12.8	正常	0.0	0.2

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
东源县蓝口镇榄围村	潴育型	吉田优622	20.5	77.8	7.0	2.5	0.0	4.1	0.4	0.0	55.5	12.2	正常	0.0	0.6
和平县彭寨镇墩史村	淹育型	香粘	19.2	78.0	5.7	0.0	0.0	4.8	0.9	0.0	52.8	10.2	正常	0.0	0.3
和平县大坝镇高发村	淹育型	泰杂优	21.6	76.5	5.6	0.3	0.0	5.3	0.0	0.0	46.8	10.1	正常	0.0	0.4
和平县彭寨镇墩史村	淹育型	野杂优	21.5	77.0	7.2	0.3	0.0	6.2	0.7	0.0	51.3	13.3	正常	0.0	0.2
紫金县九和镇五一村	淹育型	Y两优281	20.4	79.9	2.5	0.6	0.0	1.7	0.2	0.0	68.3	10.1	正常	0.0	0.1
紫金县蓝塘镇博雅村	淹育型	软华优1179	25.6	77.0	3.2	0.6	0.0	2.5	0.1	0.0	59.4	13.4	正常	0.0	0.1
连平县上坪镇东南村	潴育型	华优1179	26.6	79.5	3.1	0.0	0.0	2.2	0.9	0.0	67.2	9.6	正常	0.0	0.2
连平县内莞镇横水（丰山队）村	潴育型	泰丰优208	24.1	78.5	1.6	0.0	0.0	1.3	0.3	0.0	50.0	13.2	正常	0.0	0.0
梅县白渡镇凤岭村	潴育型	恒丰优1179	24.0	78.0	1.7	1.7	0.0	3.3	1.7	0.0	35.0	13.0	正常	0.0	1.2
梅县水车镇梧塘村	潴育型	五优1179	27.1	77.7	6.3	0.2	0.0	3.0	3.1	0.0	40.3	13.1	正常	0.0	0.5
大埔县西河镇北塘村	潴育型	隆望两优889	22.8	76.9	4.5	0.9	0.0	3.0	0.6	0.0	31.4	12.8	正常	0.0	0.1
大埔县三河镇梓里村	潴育型	深优9528	26.1	80.3	2.6	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	44.6	13.3	正常	0.0	0.6
丰顺县潘田镇流坑村	潴育型	深优95278	23.4	78.2	4.3	2.6	0.0	1.7	0.0	0.0	51.7	13.4	正常	0.0	0.1
丰顺县丰良镇莘桥村	潴育型	恒丰优金丝苗	22.1	78.4	3.9	0.3	0.0	2.2	1.4	0.0	53.9	8.0	正常	0.0	0.1
五华县转水镇三源村	潴育型	吉田优16	19.2	76.4	7.1	0.2	0.0	5.4	1.5	0.0	30.4	6.8	正常	0.0	1.7
五华县转水镇下潭村	潴育型	吉优371	24.3	76.5	6.4	0.5	0.0	4.6	1.3	0.0	57.4	12.4	正常	0.0	0.2
五华县横陂镇章联村	潴育型	广泰优华占	25.4	79.9	3.9	1.3	0.0	1.3	1.3	0.0	36.6	12.5	正常	0.0	0.7
五华县横陂镇崇文村	潴育型	泰禾208	26.8	79.2	3.7	0.6	0.0	2.4	0.7	0.0	39.2	12.7	正常	0.0	0.0
蕉岭县三圳镇招福村	潴育型	粤泰油占	23.8	77.2	8.8	0.0	0.0	5.0	3.8	0.0	58.1	12.0	正常	0.0	3.0
蕉岭县新铺镇长江村	潴育型	泰丰优736	24.4	78.8	5.1	0.6	0.0	3.6	0.9	0.0	59.3	11.3	正常	0.0	0.8
兴宁市宁中镇蔗塘村	潴育型	19香	23.2	77.6	5.4	1.0	0.0	3.8	0.6	0.0	58.6	11.6	正常	0.0	0.8
兴宁市宁中镇鸭桥村	潴育型	隆优丝苗	22.9	77.1	7.0	1.3	0.0	3.8	1.9	0.0	62.0	13.1	正常	0.0	0.4
兴宁市叶塘镇鸭池村	潴育型	广8优金占	24.7	77.6	4.4	0.0	0.0	4.3	0.1	0.0	55.6	13.2	正常	0.0	0.1
兴宁市叶塘镇田心村	潴育型	隆优丝苗	24.8	78.3	4.8	1.4	0.0	2.0	1.4	0.0	41.1	11.8	正常	0.0	0.2
平远县中行镇中行村	潴育型	恒丰优1179	25.7	79.7	3.7	1.3	0.0	2.2	0.2	0.0	60.1	11.7	正常	0.0	0.2
平远县中行镇中行村	潴育型	五优305	23.1	78.4	6.0	1.8	0.0	0.9	3.3	0.0	55.9	12.2	正常	0.0	0.2
博罗县石湾镇黄西村	/	美香占	21.0	75.8	9.2	0.4	0.0	6.3	2.5	0.0	49.4	12.5	正常	0.0	0.1
博罗县石湾镇铁场村	/	19香	23.6	75.2	7.9	0.7	0.0	4.5	2.7	0.0	48.8	13.1	正常	0.0	0.4

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
博罗县罗阳镇塍头村	/	南桂占	22.0	75.7	5.5	1.0	0.0	3.4	1.1	0.0	54.4	12.1	正常	0.0	0.3
龙门县平陵镇路溪村	潜育型	野香优莉丝	23.5	79.8	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	56.3	8.8	正常	0.0	0.6
龙门县平陵镇竹龙村	潜育型	美香占	21.3	75.3	8.2	2.2	0.0	6.0	0.0	0.0	46.4	11.1	正常	0.0	0.3
龙门县平陵镇祖塘村	潜育型	软华优金丝	22.5	77.2	6.2	0.0	0.0	5.6	0.6	0.0	49.7	11.0	正常	0.0	2.2
惠阳区良井镇霞角村	淹育型	杂优	24.7	76.5	4.9	0.6	0.0	4.3	0.0	0.0	24.9	13.2	正常	0.0	0.0
海丰县联安镇燕洲村	淹育型	香雪丝苗	22.5	77.4	4.4	0.8	0.0	0.8	2.8	0.0	48.8	13.4	正常	0.0	0.2
海丰县可塘镇罗南村	淹育型	野青	24.7	78.7	3.1	1.2	0.0	1.9	0.0	0.0	60.5	13.4	正常	0.0	2.7
陆丰市上英镇丰铺村	淹育型	珍桂	23.4	77.5	3.7	1.1	0.0	2.6	0.0	0.0	63.7	13.5	正常	0.0	0.1
陆丰市潭西镇东山村	淹育型	珍桂	23.1	75.5	5.3	3.5	0.0	1.5	0.3	0.0	60.0	13.0	正常	0.0	0.1
陆丰市潭西镇东关村	淹育型	珍桂	21.4	75.9	6.2	3.9	0.0	1.5	0.8	0.0	47.3	13.0	正常	0.0	0.6
陆河县河田镇布金村	淹育型	野香优莉丝	22.2	77.2	6.3	0.2	0.0	4.9	1.2	0.0	53.6	13.4	正常	0.0	0.2
台山市深井镇牛围村	渗育型	金香	21.4	78.0	1.8	0.0	0.0	1.7	0.1	0.0	44.2	13.4	正常	0.0	0.5
台山市深井镇高洞村	渗育型	金香	21.2	77.3	1.8	0.1	0.0	1.6	0.1	0.0	44.9	13.4	正常	0.0	0.6
台山市大江镇茂昌村	渗育型	金香	21.8	76.6	4.5	0.4	0.0	3.8	0.3	0.0	47.6	11.5	正常	0.0	1.1
台山市大江镇河木村	渗育型	金香	22.7	75.9	6.0	0.8	0.0	4.6	0.6	0.0	44.3	11.7	正常	0.0	1.6
台山市深井镇新蚬滩村	渗育型	珍桂	21.8	76.3	5.4	0.8	0.0	4.6	0.0	0.0	53.7	13.0	正常	0.0	0.1
新会区双水镇东凌村	潜育型	马坝占	18.3	75.5	3.1	0.8	0.0	2.1	0.2	0.0	15.4	13.3	正常	0.0	0.7
新会区双水镇东陵村	潜育型	金龙丝苗	20.3	75.7	4.1	0.3	0.0	2.1	1.7	0.0	54.9	13.2	正常	0.0	0.8
新会区罗坑镇芦冲村	潜育型	南晶香占	22.6	75.9	4.0	2.6	0.0	1.1	0.3	0.0	44.9	12.1	正常	0.0	2.4
鹤山市龙口镇那白月桥村	潜育型	粤禾丝苗	23.4	74.2	14.3	0.9	0.0	12.4	1.0	0.0	46.8	13.3	正常	0.0	0.1
鹤山市龙口镇五福村	潜育型	粤正丝苗	19.4	76.5	7.3	0.4	0.0	6.5	0.4	0.0	50.8	11.0	正常	0.0	0.6
开平市蚬岗镇春山村	潜育型	牙香	20.6	77.1	4.4	0.1	0.0	3.3	1.0	0.0	42.3	9.9	正常	0.0	1.6
开平市蚬岗镇春山村	潜育型	银湖香占	20.0	77.3	4.4	1.0	0.0	3.3	0.1	0.0	58.3	12.0	正常	0.0	1.4
开平市蚬岗镇	潜育型	新马占	25.3	78.4	2.0	0.3	0.0	1.6	0.1	0.0	54.6	11.0	正常	0.0	0.7
恩平市君堂镇龙盛村	潜育型	象牙香粘	21.3	75.9	2.3	0.5	0.0	1.8	0.0	0.0	59.0	9.7	正常	0.0	0.7
恩平市君堂镇龙盛村	潜育型	珍桂矮	28.0	81.1	1.2	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	55.5	9.7	正常	0.0	0.4
阳春市八甲镇程垌村	潜育型	特优320	29.3	75.4	10.4	0.4	0.0	9.4	0.6	0.0	54.9	11.2	正常	0.0	0.1
阳春市八甲镇坡边村	潜育型	泰丰优208	22.7	78.3	4.5	0.2	0.0	3.5	0.8	0.0	58.2	9.4	正常	0.0	0.2

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
阳春市八甲镇大利村	潜育型	华优638	22.6	78.8	1.4	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	63.2	13.3	正常	0.0	0.3
江城区双捷镇康州村	潜育型	杂优	28.2	79.3	5.0	0.5	0.0	4.3	0.2	0.0	62.2	13.4	正常	0.0	0.2
江城区双捷镇康州村	潜育型	象牙香	22.4	75.1	8.1	1.0	0.0	5.6	1.5	0.0	60.3	13.0	正常	0.0	0.7
阳西县新圩镇新圩村	潜育型	珍桂矮	22.6	76.9	8.6	0.7	0.0	6.0	1.9	0.0	68.0	13.4	正常	0.0	0.4
阳西县新圩镇新圩村	潜育型	华美粘	20.3	79.6	5.3	0.0	0.0	4.6	0.7	0.0	66.4	12.5	正常	0.0	0.8
阳东区后山镇那洋村	淹育型	广西早优	22.4	75.3	5.4	0.0	0.0	2.6	2.8	0.0	61.4	13.1	正常	0.0	0.2
阳东区江丰镇潮观村	淹育型	杂优	22.2	76.5	6.1	0.0	0.0	3.6	2.5	0.0	45.9	13.3	正常	0.0	0.4
雷州市雷高镇杨家镇王家坡村	潜育型	桂野香占	21.2	77.3	5.6	0.0	0.0	5.0	0.6	0.0	54.8	13.3	正常	0.0	0.2
雷州市雷高镇杨家镇夏口村	潜育型	象牙粘	22.9	78.1	5.2	0.7	0.0	2.3	2.2	0.0	53.6	13.4	正常	0.0	0.1
吴川市黄坡镇调戈村	淹育型	莉香粘	24.4	76.6	5.0	0.0	0.0	3.7	1.3	0.0	53.5	9.6	正常	0.0	0.2
遂溪县城月镇三合下村	潜育型	粤香粘	19.8	76.2	5.0	0.6	0.0	3.6	0.8	0.0	48.6	12.1	正常	0.0	0.1
雷州市雷高镇大群村	潜育型	禾粤丝苗	18.2	79.2	3.6	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	63.9	13.3	正常	0.0	0.2
雷州市雷高镇下尾村	潜育型	特籼26	24.7	77.5	5.9	0.0	0.0	5.6	0.3	0.0	58.7	12.7	正常	0.0	0.3
雷州市雷高镇扶柳村	潜育型	特优9938	28.6	76.8	6.5	5.6	0.0	0.9	0.0	0.0	44.2	10.9	正常	0.0	0.4
徐闻县城北乡青铜北村	渗育型	建优795	25.0	76.9	6.3	0.8	0.0	5.5	0.0	0.0	61.6	10.5	正常	0.0	0.2
徐闻县下桥镇六片田村	渗育型	博优938	25.0	77.5	5.4	0.5	0.0	4.9	0.0	0.0	56.2	10.4	正常	0.0	0.1
徐闻县迈陈镇青铜新村	渗育型	特优5511	25.4	75.4	8.1	1.0	0.0	6.5	0.6	0.0	45.1	10.7	正常	0.0	0.1
徐闻县迈陈镇湖南村	渗育型	特优5511	27.6	77.0	3.1	0.3	0.0	2.8	0.0	0.0	44.7	9.3	正常	0.0	0.4
徐闻县迈陈镇打银村	渗育型	博优938	25.8	75.5	8.1	0.0	0.0	7.3	0.8	0.0	56.9	10.7	正常	0.0	0.4
徐闻县下桥镇墙垌村	渗育型	特优5511	27.9	77.7	8.4	0.0	0.0	6.8	1.6	0.0	56.1	9.7	正常	0.0	0.3
徐闻县城北乡南新村	渗育型	博优938	28.5	68.1	34.1	0.2	0.0	4.2	29.7	0.0	55.9	13.3	正常	0.0	0.4
遂溪县城月镇田头村	潜育型	美香占	20.8	78.0	4.5	0.6	0.0	3.9	0.0	0.0	56.9	11.4	正常	0.0	1.0
廉江市营仔镇营仔村	潜育型	珍桂矮	22.9	77.2	4.9	1.6	0.0	2.5	0.8	0.0	64.2	11.7	正常	0.0	0.3
廉江市营仔镇白沙村	潜育型	珍桂矮	20.6	78.5	4.2	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	58.5	12.1	正常	0.0	0.2
吴川市黄坡镇新屋村	淹育型	珍桂矮	20.4	78.5	4.3	1.2	0.0	3.1	0.0	0.0	59.8	13.2	正常	0.0	0.2
吴川市黄坡镇调戈村	淹育型	珍桂矮	22.6	79.7	3.0	0.3	0.0	2.5	0.2	0.0	59.0	11.6	正常	0.0	0.2
茂南区镇盛镇梅江村	潜育型	华盛顿京贵占	25.6	79.1	1.5	0.3	0.0	1.0	0.2	0.0	46.4	9.5	正常	0.0	0.6
茂南区镇盛镇乌石村	潜育型	新优1618	25.9	78.4	5.2	1.0	0.0	4.2	0.0	0.0	46.2	11.9	正常	0.0	0.3

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
电白区马踏镇下山村	潜育型	珍桂	25.8	75.1	7.9	1.2	0.0	5.5	1.2	0.0	57.8	12.6	正常	0.0	0.2
电白区马踏镇下山村	潜育型	珍桂	24.6	78.6	4.1	0.0	0.0	3.9	0.2	0.0	68.7	11.0	正常	0.0	0.4
电白区马踏镇陈屋村	潜育型	香粘	22.3	76.7	4.2	0.3	0.0	3.9	0.0	0.0	65.5	12.4	正常	0.0	0.3
电白区马踏镇陈屋村	潜育型	灿优8号	23.3	77.2	7.2	0.9	0.0	6.3	0.0	0.0	62.6	11.1	正常	0.0	0.3
电白区马踏镇下河村	潜育型	灿优8号	22.4	74.3	11.6	0.0	0.0	10.4	1.2	0.0	49.4	10.0	正常	0.0	0.5
高州市谢鸡村榕木根村	潜育型	籼优	23.6	77.8	3.1	0.6	0.0	2.5	0.0	0.0	54.2	10.9	正常	0.0	0.4
高州市谢鸡村六池村	潜育型	籼优911	23.9	79.6	1.7	0.3	0.0	1.4	0.0	0.0	53.0	9.8	正常	0.0	0.2
高州市山美镇旭务村	潜育型	兴两优3089	21.3	75.7	8.9	0.0	0.0	8.3	0.6	0.0	64.6	9.9	正常	0.0	1.4
高州市山美镇细水村	潜育型	籼优911	21.8	78.5	3.3	0.9	0.0	2.4	0.0	0.0	53.4	9.9	正常	0.0	0.3
高州市山美镇和坑村	潜育型	兴两优3089	21.6	75.6	9.7	0.2	0.0	9.2	0.3	0.0	63.9	10.2	正常	0.0	1.7
化州市良光镇长安村	潜育型	珍桂矮	24.2	63.7	40.0	0.7	0.0	3.1	36.9	0.0	49.8	13.2	正常	0.0	1.6
化州市合江镇梧村	潜育型	珍桂矮	23.2	76.6	5.9	0.3	0.0	5.0	0.6	0.0	57.0	13.2	正常	0.0	0.3
化州市笪桥镇塘贡村	潜育型	珍桂矮	24.5	64.0	21.3	2.4	0.0	4.0	28.7	0.0	46.4	13.3	正常	0.0	0.1
化州市杨梅镇沙路村	潜育型	梅桂矮	24.5	65.9	33.9	0.5	0.0	3.4	28.8	0.0	49.2	13.2	正常	0.0	0.1
化州市良光镇田界垌村	潜育型	梅桂矮	24.4	61.1	44.8	0.2	0.0	3.4	41.2	0.0	50.5	13.4	正常	0.0	0.1
信宜市池洞镇石庆村	潜育型	显香两优香丝	22.6	76.4	5.0	0.0	0.0	1.8	3.2	0.0	67.0	13.1	正常	0.0	0.2
信宜市东镇十腰村	潜育型	Y两优911	22.4	76.5	5.9	0.2	0.0	5.4	0.3	0.0	60.9	9.0	正常	0.0	0.1
信宜市平塘镇湾龙村	潜育型	恒丰优999	23.0	79.6	4.0	0.3	0.0	3.1	0.6	0.0	54.0	10.8	正常	0.0	0.1
信宜市合水镇横水村	潜育型	中研优519	35.1	77.4	7.8	0.7	0.0	3.8	3.3	0.0	48.6	9.8	正常	0.0	0.1
信宜市合水镇新云村	潜育型	广发优2156	28.6	78.2	7.1	3.7	0.0	2.9	0.5	0.0	48.1	13.1	正常	0.0	0.1
德庆县马圩镇大邦垌村	潜育型	恒丰优778	23.0	77.4	5.8	0.2	0.0	2.5	3.1	0.0	38.5	11.2	正常	0.0	0.2
德庆县官圩镇五福村	潜育型	幼粘84	20.4	75.9	7.7	0.0	0.0	2.5	5.2	0.0	59.3	11.3	正常	0.0	0.7
封开县长岗镇前程村	潜育型	珍桂矮	22.1	77.8	6.0	0.5	0.0	2.4	3.1	0.0	47.4	12.2	正常	0.0	0.1
封开县长岗镇前程村	潜育型	特优608	25.1	78.6	6.0	0.2	0.0	5.7	0.1	0.0	54.4	12.5	正常	0.0	0.1
高要区活道镇横石村	淹育型	中软粘	20.6	76.7	11.1	1.2	0.0	5.1	4.8	0.0	52.8	10.7	正常	0.0	0.2
高要区活道镇横石村	淹育型	中软粘	20.4	77.8	5.6	0.0	0.0	4.0	1.6	0.0	58.3	13.4	正常	0.0	0.1
高要区活道镇横石村	淹育型	中软粘	22.0	76.6	5.3	0.0	0.0	2.5	2.8	0.0	52.4	10.9	正常	0.0	0.0
高要区活道镇横石村	淹育型	中软粘	21.7	75.3	9.3	0.4	0.0	8.0	0.9	0.0	54.5	10.0	正常	0.0	0.2

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
广宁县南街镇红星村	潜育型	广8优粤禾丝苗	20.9	78.2	4.7	0.0	0.0	2.1	2.6	0.0	52.2	12.1	正常	0.0	0.1
广宁县南街镇富溪村	潜育型	兴两优3089	20.0	78.2	7.3	1.2	0.0	5.5	0.6	0.0	55.2	11.1	正常	0.0	0.1
广宁县南街镇富溪村	潜育型	美香两优晶丝	21.0	76.0	4.8	0.0	0.0	4.2	4.6	0.0	48.7	11.9	正常	0.0	0.5
怀集县蓝钟镇下竹黄三村	潜育型	杂优	20.5	77.9	5.1	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	50.0	10.2	正常	0.0	0.9
怀集县岗坪镇睦洲村	潜育型	野丰优668	18.0	76.3	8.0	0.5	0.0	5.6	2.9	0.0	44.2	13.2	正常	0.0	0.7
怀集县梁村镇荐水新寨村	潜育型	优质谷	19.9	78.2	9.7	4.8	0.0	2.3	2.6	0.0	52.7	13.1	正常	0.0	0.2
四会市迳口镇凤凰村	潜育型	杂优	22.4	77.1	6.1	3.0	0.0	2.2	0.9	0.0	58.8	13.0	正常	0.0	0.3
四会市迳口镇凤凰村	潜育型	杂优	21.8	76.6	3.9	2.2	0.0	1.7	0.0	0.0	56.7	13.2	正常	0.0	1.0
四会市迳口镇南乡旧村	潜育型	杂优	23.4	70.7	22.5	0.0	0.0	18.1	4.4	0.0	44.2	13.0	正常	0.0	0.9
四会市江谷镇大洞苏坑村	潜育型	杂优	19.0	76.0	3.5	0.3	0.0	3.2	0.0	0.0	61.8	13.3	正常	0.0	0.1
连州市西岸镇西岸村	潜育型	油粘	22.4	77.2	3.8	1.1	0.0	2.1	0.6	0.0	34.5	10.6	正常	0.0	0.1
连州市西岸镇西岸村	潜育型	丰优	21.8	78.6	3.5	1.1	0.0	2.4	0.0	0.0	49.4	11.3	正常	0.0	0.4
清新区浸潭镇根一村	潜育型	野香优巴士	19.5	77.9	3.4	0.7	0.0	2.7	0.0	0.0	62.6	12.4	正常	0.0	0.0
清新区浸潭镇留良洞村	潜育型	恒丰优金丝苗	25.0	75.7	9.1	3.5	0.0	5.6	0.0	0.0	53.2	13.4	正常	0.0	0.5
佛冈县迳头镇湖洋村	潜育型	广8金粘	24.1	78.4	3.1	0.9	0.0	2.2	0.0	0.0	58.8	11.0	正常	0.0	0.3
英德市东华镇鱼湾村	淹育型	珍桂	22.8	78.2	3.8	1.2	0.0	2.6	0.0	0.0	56.4	10.4	正常	0.0	0.4
英德市白沙镇红星村	淹育型	泰丰优	21.0	78.3	5.6	2.2	0.0	3.4	0.0	0.0	64.9	11.5	正常	0.0	0.3
清城区石角镇舟山村	渗育型	鬼粘	21.3	75.7	8.8	0.8	0.0	6.2	1.8	0.0	46.6	11.8	正常	0.0	0.1
阳山县七拱镇七拱村	潜育型	金象19香	20.8	75.6	9.3	0.0	0.0	8.0	1.3	0.0	53.0	13.4	正常	0.0	0.0
阳山县七拱镇七拱村	潜育型	奥泰丝苗	19.3	77.8	2.6	0.7	0.0	1.9	0.0	0.0	66.8	13.4	正常	0.0	1.0
阳山县七拱镇七拱村	潜育型	清远粘	21.1	79.1	3.6	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	45.0	13.4	正常	0.0	0.3
潮安区江东镇仙洲村	渗育型	Y两优1378	22.6	77.4	7.3	1.1	0.0	4.3	1.9	0.0	60.8	13.1	正常	0.0	0.1
潮安区浮洋镇陇美村	潜育型	华航51号	22.3	77.0	5.7	0.0	0.0	5.0	0.7	0.0	50.0	11.7	正常	0.0	0.1
潮安区浮洋镇斗文村	潜育型	竹香粘	40.2	77.8	4.1	1.1	0.0	2.4	0.6	0.0	59.4	13.4	正常	0.0	0.2
潮安区浮洋镇桃李院村	潜育型	Y两优3088	21.3	77.1	3.7	0.3	0.0	3.0	0.4	0.0	51.1	11.3	正常	0.0	0.1
揭东县霖磐镇德中村	淹育型	杂优808	29.9	79.4	4.7	2.8	0.0	1.5	0.4	0.0	58.7	12.1	正常	0.0	1.2
揭东县月城镇长福村	淹育型	杂优308	22.0	77.6	3.6	3.1	0.0	0.5	0.0	0.0	58.8	12.4	正常	0.0	0.6
揭西县金和镇和西村	淹育型	新优611	25.2	77.2	5.7	0.6	0.0	3.8	1.3	0.0	39.4	11.9	正常	0.0	0.1

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
惠来县隆江镇风光村	潜育型	雪香	31.2	78.4	5.0	0.3	0.0	2.7	2.0	0.0	59.6	11.7	正常	0.0	0.5
惠来县隆江镇风光村	潜育型	圆粒524	23.2	77.2	3.7	1.1	0.0	2.3	0.3	0.0	55.2	12.3	正常	0.0	0.5
榕城区砲台镇龙头村	淹育型	野香优703	25.0	75.9	6.9	0.7	0.0	2.5	3.7	0.0	50.2	12.7	正常	0.0	0.3
普宁市麒麟镇新溪村	潜育型	杂优087	29.8	79.1	4.6	0.5	0.0	4.1	0.0	0.0	31.7	12.7	正常	0.0	0.3
普宁市南径镇横山尾村	潜育型	杂优795	26.4	78.2	6.1	0.6	0.0	4.3	1.2	0.0	33.6	13.1	正常	0.0	0.2
普宁市麒麟镇新溪村	潜育型	杂优9506	26.7	79.6	3.6	0.2	0.0	3.0	0.4	0.0	34.0	13.0	正常	0.0	0.2
普宁市南径镇横山尾村	潜育型	杂优298	25.5	79.2	3.9	0.3	0.0	3.1	0.5	0.0	39.1	13.2	正常	0.0	0.2
云城区思劳镇三坑村	潜育型	Y二优345	21.4	77.6	3.5	0.8	0.0	2.7	0.0	0.0	58.4	13.3	正常	0.0	0.5
云城区思劳镇三坑村	潜育型	五香丝苗	22.6	78.0	3.1	1.3	0.0	1.8	0.0	0.0	54.9	13.2	正常	0.0	0.1
云安区镇安镇公安村委木尾村	潜育型	增香丝隆望两优889	20.0	77.6	4.1	0.2	0.0	3.1	0.8	0.0	48.2	12.9	正常	0.0	0.1
云安区镇安镇公安村委南木洲村	潜育型	耕香优荔丝苗	21.3	73.3	14.9	5.5	0.0	2.8	6.6	0.0	43.2	13.3	正常	0.0	1.1
罗定市罗镜镇镜东村	潜育型	美香占2号	18.6	75.8	8.9	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	44.1	13.4	正常	0.0	2.8
罗定市莘塘镇周沙村	潜育型	美香占	20.7	76.6	4.6	0.6	0.0	4.0	0.0	0.0	59.8	13.1	正常	0.0	0.2
新兴县太平镇显村	潜育型	象牙香粘	21.9	77.6	5.0	2.4	0.0	2.6	0.0	0.0	40.4	13.1	正常	0.0	0.1
新兴县太平镇显村	潜育型	新软香粘	21.1	76.3	5.3	0.3	0.0	4.4	0.6	0.0	36.9	13.3	正常	0.0	0.1
郁南县东坝镇大坪村	淹育型	Y两优133	20.2	78.8	2.7	0.2	0.0	2.5	0.0	0.0	59.9	12.7	正常	0.0	0.1
郁南县东坝镇大坪村	淹育型	广八金占	22.6	77.7	2.6	0.6	0.0	2.0	0.0	0.0	51.4	13.2	正常	0.0	0.2
郁南县东坝镇大坪村	淹育型	野香优稻	21.0	77.7	5.0	0.9	0.0	4.1	0.0	0.0	64.6	13.4	正常	0.0	0.1
从化区鳌头镇横江村	潜育型	美香占	21.0	78.1	5.6	1.8	0.0	3.8	0.0	0.0	51.8	11.8	正常	0.0	0.8
澄海区莲下镇北湾村	潜育型	五乡优1918	23.2	78.8	2.3	0.5	0.0	0.6	1.2	0.0	44.3	11.5	正常	0.0	0.9
朝阳区关埠镇玉一村	淹育型	杂优大粒	28.4	78.6	6.1	1.1	0.0	3.1	1.9	0.0	51.7	13.0	正常	0.0	1.6
潮南区陇田镇溪西村	渗育型	杂优2068	25.9	78.6	8.6	0.7	0.0	1.0	6.9	0.0	65.2	13.4	正常	0.0	0.5
曲江区枫湾镇步村	潜育型	美香占	20.0	75.8	5.9	0.1	0.0	3.6	2.2	0.0	63.7	13.2	正常	0.0	0.2
乐昌市廊田镇早禾田窝坑村	淹育型	台香	18.7	77.1	4.7	0.7	0.0	4.0	0.0	0.0	53.5	13.4	正常	0.0	0.3
南雄市雄州街道迳口村	渗育型	泰优208	25.4	78.6	7.1	2.3	0.0	4.8	0.0	0.0	59.8	13.1	正常	0.0	0.1
始兴县沈所镇	咸酸型	美香占2号	18.7	75.1	10.9	0.3	0.0	6.3	4.3	0.0	64.6	13.4	正常	0.0	0.4
东源县船塘镇岭头村	潜育型	恒丰优	26.9	77.0	5.6	0.0	0.0	5.0	0.6	0.0	55.3	13.3	正常	0.0	0.8
龙川县鹤市镇罗乐村	潜育型	泰丰优208	22.9	76.1	7.0	1.8	0.0	2.5	2.7	0.0	52.9	13.4	正常	0.0	1.0

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
龙川县鹤市镇罗乐村	潜育型	泰丰优208	23.0	78.0	7.2	3.0	0.0	3.1	1.1	0.0	53.5	13.4	正常	0.0	0.3
和平县彭寨镇大扩面村	淹育型	深优918	26.3	77.0	3.1	0.7	0.0	2.4	0.0	0.0	68.9	11.4	正常	0.0	0.1
紫金县紫城镇仕贵村	淹育型	恒丰优778	24.1	78.2	4.2	1.8	0.0	1.7	0.7	0.0	52.5	11.8	正常	0.0	0.1
连平县上坪镇惠西村	潜育型	龙牙粘	21.6	78.6	3.4	0.4	0.0	3.0	0.0	0.0	57.7	10.6	正常	0.0	0.3
梅县白渡镇嵩灵村	潜育型	满香优905	22.0	76.7	7.6	0.1	0.0	7.5	0.0	0.0	41.1	8.8	正常	0.0	0.8
大埔县西河镇东塘村	潜育型	深两优1378	25.3	75.9	6.1	1.1	0.0	5.0	0.0	0.0	58.9	12.8	正常	0.0	0.1
丰顺县丰良镇城东村	潜育型	昱香两优8号	20.9	76.9	5.5	1.3	0.0	4.2	0.0	0.0	60.8	9.5	正常	0.0	0.1
五华县转水镇下潭村	潜育型	泰丰优208	21.7	76.7	9.5	0.1	0.0	4.5	4.9	0.0	38.8	11.1	正常	0.0	0.9
蕉岭县三圳镇招福村	潜育型	美巴香占	21.2	77.3	4.0	0.9	0.0	3.1	0.0	0.0	50.1	10.8	正常	0.0	0.4
蕉岭县蕉城镇龙安村	潜育型	粤泰油占	21.3	80.7	3.3	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	66.2	13.2	正常	0.0	0.4
兴宁市叶塘镇田心村	潜育型	美巴香占	23.1	76.9	4.8	1.1	0.0	3.7	0.0	0.0	61.6	12.7	正常	0.0	0.2
平远县河头镇黄田村	潜育型	弘优689	21.7	77.9	2.6	0.6	0.0	2.0	0.0	0.0	19.4	9.5	正常	0.0	0.2
惠城区横沥镇	淹育型	丝苗粘	17.8	76.8	6.9	0.3	0.0	5.6	1.0	0.0	47.4	10.9	正常	0.0	0.1
惠东县平海镇油麻园村	淹育型	丝苗	22.2	75.3	11.2	0.9	0.0	8.1	2.2	0.0	52.5	12.0	正常	0.0	0.1
惠东县铁涌镇沙桥村	淹育型	南晶香粘	19.8	77.8	4.2	0.3	0.0	1.9	2.0	0.0	48.7	11.3	正常	0.0	0.3
惠东县铁涌镇沙桥村	淹育型	三二矮	21.0	79.6	3.3	0.4	0.0	2.0	0.9	0.0	60.1	13.1	正常	0.0	0.2
海丰县梅陇镇云路村	淹育型	丰华	25.0	75.2	5.0	0.5	0.0	4.4	0.1	0.0	57.3	13.4	正常	0.0	1.1
海丰县可塘镇黄厝港村	淹育型	香雪丝苗	25.3	73.4	14.1	0.0	0.0	12.6	1.5	0.0	58.0	13.3	正常	0.0	0.3
陆丰市河西镇湖田村	淹育型	珍桂	20.5	75.4	4.4	1.2	0.0	3.2	0.0	0.0	60.8	13.4	正常	0.0	0.0
台山市深井镇井东村	渗育型	野丝	20.4	76.0	8.1	1.3	0.0	6.8	0.0	0.0	55.0	13.0	正常	0.0	0.8
台山市深井镇井西村	渗育型	原种象牙	20.9	75.6	3.9	3.3	0.0	0.6	0.0	0.0	52.0	12.4	正常	0.0	0.6
台山市深井镇獭山村	渗育型	原种象牙	20.7	76.2	4.3	2.9	0.0	1.0	0.4	0.0	52.0	12.5	正常	0.0	0.8
新会区司前镇篁岗村	潜育型	百香粘	19.9	76.7	5.8	2.8	0.0	3.0	0.0	0.0	60.0	12.3	正常	0.0	0.5
新会区罗坑镇芦冲村	潜育型	象牙粘	21.7	75.1	9.4	1.2	0.0	6.0	2.2	0.0	63.4	13.1	正常	0.0	0.1
开平市马冈镇虎山村	潜育型	邦两优香丝苗	22.0	78.8	4.9	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	61.0	9.1	正常	0.0	0.1
开平县马冈镇虎山村	潜育型	又香玉龙丝苗	18.8	74.3	10.8	0.0	0.0	10.2	0.6	0.0	32.1	9.5	正常	0.0	1.6
恩平市君堂镇龙盛村	潜育型	米岗油粘	24.8	76.0	6.7	1.1	0.0	3.7	1.9	0.0	60.1	13.1	正常	0.0	0.2
阳春市八甲镇马四村	潜育型	黄华粘	19.6	76.1	6.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	46.0	13.4	正常	0.0	0.0

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
阳西县新圩镇新圩村	潜育型	粳香优利丝	24.6	75.1	9.9	0.9	0.0	8.1	0.9	0.0	50.3	13.4	正常	0.0	0.1
江城区埠场镇那栋村	潜育型	美香占2号	18.5	75.1	9.8	1.3	0.0	8.5	0.0	0.0	55.6	12.5	正常	0.0	0.4
阳东区大沟镇大沟村	淹育型	广西小优香	21.0	76.9	7.0	0.4	0.0	3.8	2.8	0.0	59.0	13.1	正常	0.0	0.2
雷州市雷高镇大群村	潜育型	桂野香占	21.8	78.7	5.8	1.7	0.0	3.8	0.3	0.0	53.8	11.4	正常	0.0	0.2
雷州市雷高镇大群村	潜育型	象牙粘	22.0	76.1	8.0	4.4	0.0	3.2	0.4	0.0	52.9	13.3	正常	0.0	0.2
雷州市雷高镇雷高村	潜育型	桂野香占	22.5	78.5	5.5	0.6	0.0	4.1	0.8	0.0	52.9	11.3	正常	0.0	0.4
雷州市雷高镇扶柳村	潜育型	桂野香占	21.4	77.3	4.9	0.9	0.0	3.1	0.9	0.0	54.8	11.6	正常	0.0	0.2
吴川市黄坡镇新屋村	淹育型	桂野香占	21.6	77.3	4.2	1.2	0.0	2.4	0.6	0.0	53.3	12.5	正常	0.0	0.5
遂溪县城月镇陈家村	潜育型	粤香粘	19.2	79.8	5.0	0.5	0.0	4.2	0.3	0.0	50.8	12.7	正常	0.0	1.0
雷州市雷高镇大群村	潜育型	特籼25	24.0	78.0	5.0	0.0	0.0	4.8	0.2	0.0	66.1	13.3	正常	0.0	0.0
徐闻县城北乡那种村	渗育型	博优938	20.6	78.0	6.2	0.2	0.0	4.9	1.1	0.0	51.8	10.4	正常	0.0	0.1
遂溪县城月镇洪宅村	潜育型	美香占	25.1	77.8	4.2	0.9	0.0	2.9	0.4	0.0	46.9	12.6	正常	0.0	0.0
茂南区镇盛镇梅江村	潜育型	显香两优8号	20.8	78.7	4.5	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	58.0	8.3	正常	0.0	0.1
电白区马踏镇中间村	潜育型	粘子	24.3	79.1	3.1	0.7	0.0	2.0	0.4	0.0	48.0	13.2	正常	0.0	0.0
电白区马踏镇风门村	潜育型	Y两优	22.8	78.7	2.5	0.4	0.0	2.1	0.0	0.0	60.1	13.1	正常	0.0	0.0
高州市南塘镇夏口村	潜育型	全优华粘	27.7	76.2	7.6	2.3	0.0	2.0	3.3	0.0	54.9	13.3	正常	0.0	0.0
高州市南塘镇周村	潜育型	深两优1378	22.8	78.1	3.4	0.3	0.0	1.9	1.2	0.0	64.8	13.4	正常	0.0	0.0
化州市良光镇豺岭村	潜育型	红米	22.9	78.4	1.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	64.6	11.7	正常	0.0	1.4
化州市那务镇蛇地坡	潜育型	珍珠矮	21.5	78.6	5.4	0.5	0.0	0.5	4.4	0.0	63.4	13.0	正常	0.0	0.6
信宜市北界镇金渠村	潜育型	鹏优6377	23.1	78.6	4.7	0.6	0.0	3.5	0.6	0.0	52.8	10.9	正常	0.0	1.9
信宜市北界镇六琶村	潜育型	Y两优602	22.1	75.0	15.3	0.5	0.0	7.1	7.7	0.0	59.5	13.3	正常	0.0	0.2
德庆县新圩镇历麻村	潜育型	野香粘	23.5	75.6	7.1	0.6	0.0	5.5	1.0	0.0	44.3	10.4	正常	0.0	0.2
德庆县马圩镇大邦垌村	潜育型	香优886	23.6	76.5	11.6	0.4	0.0	1.2	10.0	0.0	31.4	10.5	正常	0.0	0.3
封开县长岗镇前程村	潜育型	丝苗	22.5	77.4	6.3	1.9	0.0	3.7	0.7	0.0	39.8	11.5	正常	0.0	2.3
封开县长岗镇前程村	潜育型	小黄粘	19.9	75.5	9.1	0.3	0.0	5.7	3.1	0.0	31.4	10.6	正常	0.0	0.4
高要区活道镇横石村	淹育型	中软粘	18.9	79.4	2.9	0.4	0.0	2.5	0.0	0.0	47.9	10.5	正常	0.0	0.1
广宁县南街镇红星村	潜育型	广8优金占	21.3	79.5	5.6	1.2	0.0	3.2	1.2	0.0	45.1	9.9	正常	0.0	0.2
怀集县马宁镇马宁旧屋村	潜育型	泰丰优208	21.9	76.9	5.1	3.2	0.0	1.9	0.0	0.0	61.6	11.9	正常	0.0	0.1

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
四会市迳口镇凤凰村	潜育型	杂优	21.5	75.8	9.3	0.6	0.0	6.3	2.4	0.0	56.6	11.3	正常	0.0	0.0
连州市西岸镇西岸村	潜育型	泰丰优208	20.7	78.2	2.6	0.8	0.0	1.8	0.0	0.0	69.8	13.3	正常	0.0	0.4
清新区浸潭镇山仔头	潜育型	野香优莉丝	21.0	78.1	4.7	1.1	0.0	3.6	0.0	0.0	58.7	13.4	正常	0.0	3.5
佛冈县迳头镇楼下村	潜育型	野香优莉丝	20.5	77.0	3.4	1.5	0.0	1.9	0.0	0.0	50.7	13.4	正常	0.0	0.3
英德市白沙镇车头曾屋村	淹育型	珍桂	20.8	78.1	3.2	2.5	0.0	0.5	0.2	0.0	65.2	11.9	正常	0.0	0.3
清城区石角镇舟山村	渗育型	野生粘	20.2	76.3	1.8	0.5	0.0	1.0	0.3	0.0	65.0	11.7	正常	0.0	0.0
潮安区江东镇仙洲村	渗育型	Y两优1173	20.7	79.5	2.0	0.4	0.0	0.7	0.9	0.0	59.4	12.0	正常	0.0	0.3
潮安区江东镇仙洲村	渗育型	显香两优8号	21.1	79.1	3.1	0.5	0.0	1.7	0.9	0.0	61.0	12.1	正常	0.0	0.4
揭东县霖磐镇南塘村	淹育型	十九香	23.3	76.3	4.6	0.5	0.0	3.5	0.6	0.0	51.7	13.0	正常	0.0	0.0
揭西县大溪镇井新村	淹育型	杂优	22.8	76.5	7.4	1.1	0.0	5.5	0.8	0.0	23.9	9.9	正常	0.0	0.0
揭西县灰寨镇向阳村、上角村	淹育型	香谷	21.1	78.9	3.2	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	51.1	10.4	正常	0.0	0.6
惠来县东陇镇苗海铜炉村	潜育型	特优308	30.0	79.9	4.0	1.0	0.0	0.9	2.1	0.0	53.4	13.3	正常	0.0	2.1
云城区思劳镇三坑村	潜育型	美香两优晶丝	21.6	75.9	2.4	0.9	0.0	1.4	0.1	0.0	47.9	13.1	正常	0.0	0.7
云安区镇安镇何西村委车墩村	潜育型	美香两优晶丝	21.8	76.9	1.6	0.1	0.0	1.5	0.0	0.0	42.8	13.2	正常	0.0	0.6
罗定市素龙镇凤塘村	潜育型	竹香粘	18.3	78.2	4.4	0.7	0.0	3.7	0.0	0.0	55.8	12.1	正常	0.0	0.2
新兴县东成镇思本村	潜育型	广八优	19.7	78.1	2.5	1.9	0.0	0.6	0.0	0.0	55.3	11.6	正常	0.0	0.2
深汕合作区赤石镇大安村	淹育型	粤禾丝苗米	21.2	77.0	4.9	1.7	0.0	3.0	0.2	0.0	46.7	9.5	正常	0.1	0.6
雷州市雷高镇大群村	潜育型	特籼26	25.5	78.9	3.0	0.3	0.0	2.3	0.3	0.1	57.2	12.6	正常	0.0	0.3
雷州市雷高镇下尾村	潜育型	禾粤丝苗	28.0	79.8	1.7	0.2	0.0	1.4	0.0	0.1	60.0	13.9	正常	0.0	0.3
雷州市雷高镇山前村	潜育型	特优9938	28.0	77.1	3.8	0.5	0.0	2.9	0.3	0.1	42.5	13.4	正常	0.0	1.8
雷州市杨家镇王家坡村	潜育型	特籼25	24.4	78.0	3.7	0.1	0.0	3.5	0.0	0.1	66.9	14.5	正常	0.2	0.8
徐闻县城北乡那松村	渗育型	博优938	28.6	78.3	3.4	0.1	0.0	2.8	0.0	0.5	56.7	11.4	正常	0.0	0.1
徐闻县城北乡南田村	渗育型	建优795	28.7	79.2	2.5	0.1	0.0	2.2	0.0	0.2	55.3	11.0	正常	0.0	0.3
徐闻县下桥镇东坑村	渗育型	博优938	28.7	77.4	6.6	0.0	0.0	6.4	0.2	0.0	61.5	9.4	正常	0.0	0.4
徐闻县迈陈镇九亩村	渗育型	特优5511	26.5	78.9	3.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.7	56.8	11.2	正常	0.0	0.4
徐闻县迈陈镇龙马村	渗育型	特优5511	27.8	77.9	3.9	0.1	0.0	3.6	0.0	0.2	47.9	11.1	正常	0.0	0.2
徐闻县迈陈镇龙潭村	渗育型	博优938	28.5	78.9	3.0	0.1	0.0	2.9	0.0	0.0	51.0	11.1	正常	0.0	0.2
徐闻县龙塘镇虎头村	渗育型	博优938	28.7	78.6	3.1	0.4	0.0	2.3	0.1	0.3	49.0	11.0	正常	0.0	0.2

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
徐闻县迈陈镇堤塘村	渗育型	博优938	25.3	79.5	2.1	0.3	0.0	1.5	0.1	0.2	57.6	12.3	正常	0.0	0.2
遂溪县城月镇扶良东村	潜育型	特优5511	27.0	77.0	6.8	0.0	0.0	6.0	0.0	0.8	67.3	11.6	正常	0.0	0.1
遂溪县城月镇坎塘村	潜育型	特优5511	27.2	77.3	6.4	0.0	0.0	5.8	0.0	0.6	68.4	11.6	正常	0.0	0.1
遂溪县城月镇铺仔村	潜育型	粤香粘	21.3	78.1	3.0	0.1	0.0	2.8	0.1	0.0	60.3	10.9	正常	0.0	1.2
遂溪县城月镇五里堂西村	潜育型	粤香粘	23.0	78.1	5.3	0.1	0.0	5.0	0.0	0.2	59.9	10.7	正常	0.0	1.5
遂溪县城月镇三合上村	潜育型	粤香粘	22.3	79.3	3.2	0.1	0.0	2.9	0.0	0.2	59.9	10.7	正常	0.0	1.8
遂溪县城月镇后溪村	潜育型	珍桂矮	23.6	79.1	1.4	0.1	0.0	1.3	0.0	0.0	65.7	11.9	正常	0.0	1.5
遂溪县城月镇三榜村	潜育型	珍桂矮	22.5	79.0	1.0	0.1	0.0	0.8	0.0	0.1	66.2	12.0	正常	0.0	0.8
廉江市营仔镇草塘村	潜育型	珍桂矮	23.9	80.4	1.3	0.2	0.0	1.1	0.0	0.0	66.0	11.6	正常	0.0	1.2
廉江市营仔镇西洋垌村	潜育型	珍桂矮	22.3	79.8	1.1	0.1	0.0	0.8	0.2	0.0	59.9	10.9	正常	0.0	0.7
廉江市营仔镇西塘灶村	潜育型	特优7166	22.7	79.3	2.0	0.1	0.0	1.7	0.2	0.0	63.3	12.5	正常	0.0	1.6
廉江市营仔镇南一坡村	潜育型	特优7166	23.2	78.8	2.0	0.3	0.0	1.5	0.2	0.0	62.0	13.0	正常	0.0	0.6
廉江市营仔镇罗祥围村	潜育型	特优5511	21.8	79.9	1.6	0.1	0.0	1.5	0.0	0.0	56.4	11.3	正常	0.0	3.2
廉江市营仔镇罗合河村	潜育型	特优5511	21.4	79.0	1.1	0.1	0.0	0.7	0.3	0.0	59.2	11.3	正常	0.0	1.9
廉江市营仔镇罗后塘村	潜育型	博优936	23.4	80.4	1.0	0.2	0.0	0.7	0.1	0.0	66.5	12.0	正常	0.0	1.1
吴川市黄坡镇黎村	淹育型	珍桂矮	23.1	79.4	2.8	0.3	0.0	2.3	0.2	0.0	58.8	11.3	正常	0.0	0.7
吴川市黄坡镇后山下村	淹育型	珍桂矮	23.1	78.7	2.8	0.2	0.0	2.6	0.0	0.0	59.2	11.2	正常	0.0	0.5
高明区更合镇梁村	淹育型水稻土	象牙粘	21.2	76.1	5.2	1.4	0.0	1.8	2.0	0.0	44.6	9.5	正常	0.0	1.9
三水区大塘镇新莲塘村	淹育型水稻土	禅山粘	23.4	78.4	2.2	0.7	0.0	1.5	0.0	0.0	39.9	14.1	正常	0.0	0.2
从化区鳌头镇横江村	潜育型水稻土	广锋1号	21.4	78.0	3.3	0.5	0.0	2.8	0.0	0.0	52.9	9.8	正常	0.1	0.9
从化区鳌头镇横江村	潜育型水稻土	广丰粘	15.9	78.6	2.2	0.4	0.0	1.8	0.0	0.0	67.8	12.6	正常	0.0	0.3
增城区派潭镇旧高埔村	潜育型水稻土	增城银丝粘	22.1	79.4	2.1	0.2	0.0	1.9	0.0	0.0	47.1	9.7	正常	0.0	0.5
清新区浸潭镇山仔头村	潜育型水稻土	野香优莉丝	19.4	78.3	1.9	0.2	0.0	1.6	0.1	0.0	56.5	13.1	正常	0.0	1.9
清新区浸潭镇根一村	潜育型水稻土	野香优巴士	19.6	78.6	1.6	0.1	0.0	1.1	0.4	0.0	61.3	11.9	正常	0.1	0.4
清新区浸潭镇留良洞村	潜育型水稻土	恒丰金丝苗	22.9	78.2	4.8	0.1	0.0	4.6	0.1	0.0	51.7	14.7	正常	0.1	1.6
佛冈县高岗镇长江村	潜育型水稻土	亚两优	20.2	79.9	0.8	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	54.1	10.2	正常	0.0	0.4
佛冈县迳头镇楼下村	潜育型水稻土	珍桂	19.9	80.0	0.8	0.2	0.0	0.6	0.0	0.0	53.4	12.9	正常	0.0	0.4
清城区飞来峡镇东升村	潜育型水稻土	丰美粘	17.0	73.7	3.6	0.0	0.0	3.4	0.2	0.0	21.9	10.0	正常	0.0	0.6

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
清城区飞来峡镇东升村	潴育型水稻土	象牙粘	23.1	79.6	1.9	0.1	0.0	1.8	0.0	0.0	45.4	9.0	正常	0.1	0.4
阳山县黎埠镇隔江村	潴育型水稻土	常规种	19.9	78.2	2.8	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	27.3	9.0	正常	0.2	0.5
阳山县黄盆镇鸡爪湾	潴育型水稻土	常规种	23.4	80.0	1.5	0.1	0.0	1.2	0.2	0.0	58.7	14.8	正常	0.2	0.3
阳山县黄盆镇鸡爪湾	潴育型水稻土	泰优390	20.8	80.5	0.6	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	56.5	10.7	正常	0.0	0.2
英德市白沙镇车头村	淹育型水稻土	珍桂	18.7	77.6	0.9	0.3	0.1	0.4	0.1	0.0	58.5	11.4	正常	0.0	1.1
英德市东华镇鱼湾村	淹育型水稻土	珍桂	20.4	79.4	0.7	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	54.5	10.1	正常	0.0	0.2
英德市白沙镇红星村	淹育型水稻土	泰丰优	17.6	79.0	0.7	0.1	0.0	0.6	0.0	0.0	60.1	11.2	正常	0.0	0.6
连州区西岸镇西岸村	潴育型水稻土	泰丰优208	22.0	77.8	0.9	0.1	0.0	0.8	0.0	0.0	54.3	14.3	正常	0.0	0.5
连州区西岸镇西岸村	潴育型水稻土	油粘	21.2	79.6	1.4	0.1	0.0	1.3	0.0	0.0	36.0	10.0	正常	0.0	1.2
连州区西岸镇西岸村	潴育型水稻土	丰优	20.2	80.2	0.9	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	44.8	9.4	正常	0.0	0.7
惠城区水口澳背村	淹育型水稻土	19香	18.9	75.7	2.8	0.0	0.0	2.6	0.2	0.0	52.7	12.0	正常	0.2	0.1
惠城区水口澳背村	淹育型水稻土	四季粘	21.1	79.4	2.1	0.5	0.0	1.6	0.0	0.0	64.2	8.7	正常	0.0	0.9
惠东县平海镇油麻园村	淹育型水稻土	百香	21.2	75.8	2.9	0.1	0.0	2.8	0.0	0.0	54.2	12.8	正常	0.0	0.5
惠东县平海镇油麻园村	淹育型水稻土	象牙粘	20.5	75.3	4.2	0.2	0.0	4.0	0.0	0.0	52.2	11.8	正常	0.0	0.3
惠东县九龙峰读光村	淹育型水稻土	竹粘	16.2	76.2	4.1	0.2	0.0	3.9	0.0	0.0	56.9	10.3	正常	0.1	0.6
博罗县园州镇义合村	潴育型水稻土	美香粘2号	19.4	77.3	2.0	0.0	0.1	2.0	0.0	0.0	55.2	11.4	正常	0.0	1.2
博罗县石湾镇黄西村	潴育型水稻土	19香	23.8	75.8	3.7	1.0	0.0	2.7	0.0	0.0	50.8	11.9	正常	0.0	0.8
龙门县平陵街道祖塘村	潴育型水稻土	象牙粘	20.2	78.0	2.1	0.0	0.0	1.9	0.2	0.0	55.8	12.1	正常	0.3	2.0
龙门县龙华镇西溪村	潴育型水稻土	珍贵矮	20.9	79.9	2.8	0.4	0.0	2.3	0.1	0.0	67.0	12.2	正常	0.0	1.2
惠阳区良井镇霞角乌洋福村	潴育型水稻土	杂优	20.5	78.4	2.8	0.2	0.0	2.3	0.3	0.0	44.4	11.0	正常	0.3	0.6
从化区鳌头镇白岗村	潴育型	软华粘	20.5	79.7	1.0	0.4	0.0	0.6	0.0	0.0	56.8	12.8	正常	0.0	0.5
从化区鳌头镇白岗村	潴育型	南优粘	20.1	77.1	2.8	0.2	0.1	1.8	0.8	0.0	56.5	11.0	正常	0.0	0.8
增城区朱村街南岗村	潴育型	百香粘	20.5	79.4	3.9	0.3	0.2	0.7	2.7	0.0	42.8	10.8	正常	0.0	0.4
增城区朱村街南岗村	潴育型	香丝粘	20.1	78.1	2.9	0.4	0.2	0.7	1.6	0.0	53.4	11.0	正常	0.0	0.4
增城区朱村街南岗村	潴育型	美香粘	19.8	77.8	3.8	0.6	0.3	1.4	1.0	0.5	55.0	12.9	正常	0.0	0.8
增城区朱村街南岗村	潴育型	美香粘2号	20.1	80.1	2.5	1.0	0.2	1.0	0.3	0.0	48.1	11.7	正常	0.0	0.6
从化区鳌头镇横江村	潴育型	航美	20.0	77.6	4.2	1.0	0.0	0.2	3.0	0.0	48.5	10.3	正常	0.0	0.9
从化区鳌头镇横江村	潴育型	南优粘	20.6	76.8	3.5	1.1	0.0	0.6	1.8	0.0	47.1	11.3	正常	0.0	0.4

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
从化区鳌头镇横江村	潜育型	江丰粘	20.5	77.1	2.3	0.5	0.0	0.8	1.0	0.0	54.7	11.4	正常	0.0	0.8
从化区鳌头镇横江村	潜育型	粤农丝苗	20.3	76.1		1.0	0.0	1.8	0.9	0.2	43.3	10.9	正常	0.0	0.3
从化区鳌头镇横江村	潜育型	广丰粘1号	20.8	78.5	4.0	1.4	0.2	1.3	1.1	0.0	48.5	10.8	正常	0.0	0.2
从化区鳌头镇横江村	潜育型	百香粘	20.6	76.3	3.8	1.3	0.0	1.5	1.0	0.0	53.6	10.8	正常	0.0	0.7
从化区鳌头镇横江村	潜育型	美香粘	20.9	78.5	3.7	1.1	0.2	1.3	1.1	0.0	56.8	11.1	正常	0.0	0.5
从化区鳌头镇横江村	潜育型	广丰粘8号	20.5	78.4	3.1	0.8	0.3	1.6	0.4	0.0	50.7	11.3	正常	0.0	0.6
从化区鳌头镇西湖村	潜育型	粤粘	21.2	78.1	3.5	1.5	0.4	1.1	0.5	0.0	54.5	12.9	正常	0.0	0.8
从化区鳌头镇西湖村	潜育型	香粘	20.8	77.5	4.2	1.1	0.3	1.7	1.1	0.0	54.8	11.1	正常	0.0	1.3
从化区鳌头镇西湖村	潜育型	江丰粘	20.2	76.2	3.5	0.5	0.5	1.5	1.0	0.0	49.7	10.9	正常	0.0	0.8
从化区鳌头镇西湖村	潜育型	美香粘2号	20.5	77.8	2.2	0.4	0.0	1.3	0.5	0.0	61.0	12.8	正常	0.0	0.9
从化区鳌头镇西湖村	潜育型	百香粘	19.6	76.2	3.5	0.0	0.0	2.8	0.7	0.0	53.1	12.6	正常	0.0	1.1
从化区鳌头镇西湖村	潜育型	航美	19.9	77.0	3.9	0.8	0.0	1.8	1.3	0.0	48.5	12.2	正常	0.0	1.3
雷州市雷高镇大群村	潜育型、平原	特籼26	20.9	78.6	3.8	1.9	0.0	1.6	0.1	0.2	50.6	11.2	正常	0.0	0.8
雷州市雷高镇下尾村	潜育型、平原	禾粤丝苗	23.5	79.2	2.8	1.8	0.0	0.8	0.1	0.1	53.6	11.7	正常	0.0	0.6
雷州市雷高镇山前村	潜育型、平原	特优9938	22.9	78.4	4.4	3.0	0.0	1.2	0.1	0.1	58.3	10.5	正常	0.0	0.5
雷州市杨家镇王家坡村	潜育型、平原	特籼25	21.1	78.2	3.3	1.8	0.0	1.2	0.1	0.2	50.8	12.3	正常	0.0	0.4
雷州市雷高镇大群村	潜育型、平原	象牙粘	18.9	79.2	2.8	2.1	0.0	0.6	0.0	0.1	51.6	10.5	正常	0.0	1.1
吴川市吴阳镇那郭垌村	潜育型、平原	野香优莉丝	20.6	80.6	3.6	2.4	0.0	1.0	0.0	0.2	65.8	12.4	正常	0.0	0.6
吴川市吴阳镇那郭垌村	潜育型、平原	特籼粘	21.1	78.3	2.6	1.2	0.0	1.2	0.1	0.1	51.6	10.9	正常	0.0	0.2
吴川市吴阳镇宁根村	潜育型、平原	特籼粘	21.4	79.1	2.8	1.4	0.0	1.1	0.1	0.2	52.1	12.2	正常	0.0	0.4
吴川市黄坡镇新屋村	淹育型、丘陵	珍桂矮	20.3	78.5	3.4	1.4	0.0	1.6	0.2	0.2	64.1	10.8	正常	0.0	0.2
徐闻县城北乡那松村	渗育型、丘陵	博优938	21.8	80.2	2.2	1.1	0.0	0.8	0.1	0.2	68.2	11.9	正常	0.0	0.2
徐闻县城北乡南田村	渗育型、丘陵	建优795	23.5	78.2	5.7	1.2	0.0	3.9	0.2	0.4	66.7	12.2	正常	0.0	0.3
徐闻县下桥镇东坑村	渗育型、丘陵	博优938	20.8	78.1	2.2	1.7	0.2	0.3	0.0	0.0	67.0	12.1	正常	0.1	0.3
徐闻县迈陈镇龙潭村	渗育型、丘陵	博优938	21.7	77.1	5.6	2.4	0.0	2.6	0.3	0.3	67.2	13.1	正常	0.0	0.2
徐闻县迈陈镇提塘村	渗育型、丘陵	博优938	22.3	78.8	2.9	1.3	0.0	1.5	0.1	0.0	67.5	11.4	正常	0.0	0.2
徐闻县迈陈镇九亩村	渗育型、丘陵	特优5511	19.2	75.3	6.0	3.2	0.0	2.1	0.2	0.5	53.2	11.8	正常	0.0	0.2
廉江市石岭镇龙山背村	渗育型、丘陵	珍桂矮	20.6	78.2	2.5	1.6	0.0	0.8	0.0	0.1	68.4	12.7	正常	0.0	0.8

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
廉江市石岭镇龙山背村	渗育型、丘陵	特优7166	28.6	81.3	2.8	1.6	0.0	1.1	0.0	0.1	24.8	12.2	正常	0.0	0.4
遂溪县遂城镇黄沙水村	渗育型、丘陵	粤香粘	19.1	79.9	2.8	1.6	0.1	0.8	0.1	0.2	60.6	11.3	正常	0.0	0.5
遂溪县遂城镇黄沙水村	渗育型、丘陵	珍桂矮	20.1	78.9	3.5	2.8	0.0	0.5	0.0	0.2	65.4	11.2	正常	0.0	0.2
遂溪县遂城镇下洋村	渗育型、丘陵	粤香粘	18.9	79.6	2.4	1.4	0.0	0.9	0.0	0.1	69.2	12.8	正常	0.0	0.2
东城区周屋	/	香丝苗	20.9	79.8	3.2	1.4	0.0	1.8	0.0	0.0	71.3	13.4	正常	0.0	0.3
东城区周屋	/	凤新丝苗	22.3	80.3	3.8	1.5	0.0	1.9	0.4	0.0	60.2	13.5	正常	0.0	0.3
厚街镇河田	/	禾银丝苗	21.5	79.3	4.9	2.5	0.0	2.4	0.0	0.0	45.3	12.5	正常	0.0	0.3
麻涌镇麻一村	/	19香	22.1	79.4	2.4	1.3	0.0	0.8	0.3	0.0	62.0	14.0	正常	0.0	0.4
万江区新村	/	禾银丝苗	21.9	80.0	3.3	1.1	0.0	2.2	0.0	0.0	47.2	13.5	正常	0.0	0.2
洪梅镇丛涌	/	禾银丝苗	21.8	79.6	5.7	1.5	0.0	4.2	0.0	0.0	44.8	13.2	正常	0.0	0.2
万江区大莲塘	/	绿银占	23.1	77.6	4.0	0.4	0.0	3.6	0.0	0.0	55.3	13.2	正常	0.0	0.4
中堂镇凤冲村	/	禾银丝苗	21.8	79.5	4.1	1.8	0.0	2.3	0.0	0.0	46.5	14.8	正常	0.0	0.5
万江区黄粘洲	/	绿银占	23.3	77.9	3.8	0.6	0.0	3.2	0.0	0.0	55.1	13.4	正常	0.0	0.5
麻涌镇鸣涌	/	美香占2号	19.5	77.4	3.6	1.9	0.0	1.5	0.0	0.2	60.2	13.4	正常	0.0	0.3
沙田镇阁西村	/	雪花粘	20.6	75.2	2.2	1.3	0.0	0.7	0.2	0.0	58.4	14.3	正常	0.0	0.3
万江区简沙洲	/	禾银丝苗	21.7	80.2	3.7	1.2	0.0	2.4	0.0	0.1	47.4	13.6	正常	0.0	0.3
道滘镇闸口	/	杂优谷	20.3	74.2	5.9	1.1	0.0	4.8	0.0	0.0	43.7	13.1	正常	0.0	0.7
樟木头泥坡村	/	绿银占	22.2	76.2	3.1	0.6	0.0	2.3	0.2	0.0	58.3	13.7	正常	0.0	0.4
洪梅镇梅沙	/	莉香占	19.6	78.4	4.7	1.1	0.0	3.6	0.0	0.0	56.3	13.6	正常	0.0	0.4
樟木头裕丰	/	三澳占	18.2	78.9	3.2	0.5	0.0	2.7	0.0	0.0	66.1	13.4	正常	0.0	0.2
道滘大岭丫	/	雪花粘	19.8	78.4	3.3	2.0	0.0	1.0	0.3	0.0	56.2	14.0	正常	0.0	0.2
东城区周屋	/	黄广油占	25.0	77.8	4.9	1.1	0.0	3.8	0.0	0.0	44.6	13.2	正常	0.0	0.2
南城白马社区	/	美香粘	20.5	75.7	2.6	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	64.1	13.2	正常	0.0	0.4
茶山镇上元	/	杂优谷	21.7	75.9	5.9	1.3	0.0	4.4	0.2	0.0	44.6	13.4	正常	0.0	0.5
东莞市南城白马社区	丘陵	美香粘	20.2	75.2	2.3	1.5	0.0	0.2	0.6	0.0	64.8	13.6	正常	0.0	0.9
东莞市道滘大岭丫	丘陵	雪花粘	19.5	78.8	2.7	2.2	0.0	0.0	0.5	0.0	56.5	14.2	正常	0.0	0.2
东莞市沙田镇阁西村	丘陵	雪花粘	20.3	75.6	3.0	1.6	0.6	0.4	0.4	0.0	59.0	14.6	正常	0.0	0.0
东莞市东坑镇大塘村	丘陵	美香粘	20.1	78.6	3.2	2.3	0.0	0.2	0.5	0.2	62.3	13.9	正常	0.0	0.6

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
东莞市清溪镇铁场村	丘陵	美香粘	18.5	78.4	2.9	1.8	0.0	0.1	0.6	0.4	68.1	14.8	正常	0.0	0.4
东莞市清溪镇三中村	丘陵	19香	23.6	78.4	2.1	1.1	0.0	0.2	0.4	0.4	59.9	13.5	正常	0.0	0
东莞市洪梅镇金鳌沙村	丘陵	枣红糯	22.6	78.4	2.7	2.1	0.0	0.2	0.3	0.1	57.6	13.6	正常	0.0	0.0
东莞市麻涌麻一村	丘陵	19香	22.4	79.6	2.3	1.6	0.0	0.3	0.4	0.0	62.1	14.2	正常	0.0	0.5
东莞市企石镇南坑村	丘陵	丝苗米	19.6	76.8	2.4	1.5	0.0	0.1	0.5	0.3	63.8	14.9	正常	0.0	0.0
东莞市寮步镇金富村	丘陵	桂香粘	24.5	77.2	3.0	1.1	0.1	1.1	0.5	0.2	69.3	15.1	正常	0.0	0.0
东莞市石排镇沙角社区	丘陵	美香粘	18.8	80.5	2.4	1.2	0.0	0.8	0.0	0.4	69.5	13.6	正常	0.0	0.2
东莞市东城周屋社区	丘陵	香丝苗	20.8	80.1	3.2	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	71.6	13.6	正常	0.0	0.4
东莞市厚街镇新围	丘陵	早杂优	21.4	77.4	1.7	1.3	0.0	0.0	0.4	0.0	68.4	13.5	正常	0.0	0.6
东莞市厚街镇双岗	丘陵	金优粘	23.6	74.1	2.2	1.1	0.0	0.0	0.6	0.5	60.5	13.8	正常	0.0	0.5
东莞市厚街镇赤岭	丘陵	黄花粘	19.2	73.2	4.7	3.2	0.0	1.2	0.0	0.3	59.5	14.6	正常	0.0	0.5
东莞市长安镇马尾村	丘陵	粤禾丝苗	19.5	75.6	4.5	2.1	0.0	1.6	0.0	0.8	62.5	15.2	正常	0.0	0.5
东莞市桥头镇邓屋村	丘陵	粤禾丝苗	18.6	78.6	3.2	1.6	0.0	1.4	0.2	0.0	69.6	14.8	正常	0.0	0.4
东莞市高埗镇护安围	丘陵	粤禾丝苗	21.5	77.8	3.8	2.5	0.0	1.2	0.1	0.0	68.5	14.4	正常	0.0	0.6
东莞市常平镇司马村	丘陵	合美粘	21.1	74.2	2.8	0.6	0.1	1.6	0.4	0.1	66.3	13.8	正常	0.0	0.0
东莞市茶山镇上元村	丘陵	美香粘	22.6	73.9	2.5	0.5	0.0	1.5	0.5	0.0	72.8	14.2	正常	0.0	0.2
乐昌市沙洲镇石古埂村	山区	台香	18.7	75.2	0.3	0.1	0	0	0.2	0	45.2	13.4	正常	0	0.3
乐昌市沙洲镇石古埂村	山区	台香	18.9	78.3	0.3	0.2	0	0	0.1	0	46.5	13.2	正常	0	0.4
乐昌市沙洲镇石古埂村	山区	台香	16.9	76.4	0.5	0.2	0	0	0.3	0	47.3	13.1	正常	0	0.1
乐昌市沙洲镇墩背村	山区	台香	19.4	80.3	0.5	0.2	0	0	0.3	0	44.9	12.9	正常	0	0.5
乐昌市沙洲镇墩背村	山区	台香	20.0	76.8	0.4	0.3	0	0	0.1	0	48.2	12.8	正常	0	0.3
乐昌市农庄镇谭屋村	山区	杂优	22.1	80.2	0.1	0.1	0	0	0.0	0	51.0	13.4	正常	0	0.4
乐昌市农庄镇谭屋村	山区	杂优	21.9	77.2	0.3	0.1	0	0	0.2	0	50.6	13.2	正常	0	0.5
乐昌市农庄镇谭屋村	山区	银粘	21.1	76.5	0.4	0.4	0	0	0.0	0	45.8	13.0	正常	0	0.1
乐昌市农庄镇谭屋村	山区	银粘	22.6	75.9	0.5	0.5	0	0	0.0	0	44.9	12.9	正常	0	0.2
乐昌市农庄镇谭屋村	山区	银粘	23.0	76.0	0.4	0.1	0	0	0.3	0	48.3	13.2	正常	0	0.3
乐昌市沙洲镇桐木冲村	山区	漆优丝苗	19.7	77.3	0.4	0.2	0	0	0.2	0	44.3	13.3	正常	0	0.4
乐昌市沙洲镇桐木冲村	山区	丝苗	20.3	80.0	0.5	0.3	0	0	0.2	0	45.2	12.8	正常	0	0.4

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
乐昌市岩前镇朱目龙村	山区	银粘	23.7	75.8	0.1	0.1	0	0	0.0	0	46.1	12.8	正常	0	0.3
乐昌市岩前镇朱目龙村	山区	银粘	24.1	75.2	0.2	0.2	0	0	0.0	0	46.2	13.4	正常	0	0.1
乐昌市岩前镇朱目龙村	山区	台香	17.7	76.4	0.4	0.3	0	0	0.1	0	47.4	13.3	正常	0	0.2
乐昌市岩前镇朱目龙村	山区	台香	18.4	78.3	0.4	0.1	0	0	0.3	0	45.2	13.2	正常	0	0.2
乐昌市岩前镇朱目龙村	山区	台香	19.3	75.4	0.3	0.3	0	0	0.0	0	44.6	13.2	正常	0	0.3
乐昌市岩前镇邓屋村	山区	杂优	26.7	76.5	0.4	0.2	0	0	0.2	0	45.8	13.0	正常	0	0.5
乐昌市岩前镇邓屋村	山区	杂优	25.4	75.6	0.3	0.3	0	0	0.1	0	44.9	12.8	正常	0	0.5
乐昌市岩前镇邓屋村	山区	象牙粘	22.1	75.7	0.5	0.5	0	0	0.0	0	45.7	13.0	正常	0	0.2
郁南粗石村委玉兰村	淹育型水稻土	野香优8号	20.1	75.1	11.6	0.3	0.0	10.7	0.2	0.4	50.5	11.0	正常	0.1	0.6
郁南粗石村委水堀村	淹育型水稻土	Y两优	19.9	75.8	7.5	2.9	0.0	3.2	1.3	0.1	56.5	10.3	正常	0.0	0.5
郁南大坪少坝村	淹育型水稻土	野香优9号	20.6	77.7	4.3	0.3	0.0	3.5	0.2	0.4	50.4	10.6	正常	0.0	1.6
郁南大坪少坝村	淹育型水稻土	广八金占	23.0	76.4	5.9	0.2	0.0	4.5	1.0	0.1	44.2	11.6	正常	0.0	0.4
郁南大坪少坝村	淹育型水稻土	深两优	19.9	80.0	2.2	0.8	0.0	0.6	0.8	0.0	53.5	10.8	正常	0.0	0.9
云城区思劳镇三坑村	潜育型水稻土	八桂香	17.8	75.3	6.5	4.3	0.0	1.6	0.3	0.4	57.9	11.5	正常	0.0	0.6
云城区思劳镇三坑村	潜育型水稻土	野香优莉丝	16.1	76.2	3.5	2.8	0.0	0.7	0.0	0.0	49.3	10.3	正常	0.0	0.8
云安区镇安镇河西村委车教村	潜育型水稻土	美香两优晶丝	20.1	79.0	1.5	0.7	0.0	0.6	0.2	0.0	50.7	14.3	正常	0.0	0.0
云安区镇安镇河东村委背岭村	潜育型水稻土	广8优金占	21.6	73.1	15.5	1.2	0.0	13.9	0.2	0.2	36.8	11.3	正常	0.0	0.6
云安区镇安镇河西村委车教村	潜育型水稻土	广8优165	21.5	75.5	3.2	2.0	0.0	1.0	0.2	0.0	50.4	11.8	正常	0.0	1.1
新兴县太平镇罗陈村	潜育型水稻土	香丝粘	20.0	74.3	7.8	3.7	0.0	3.1	0.0	0.9	54.0	10.9	正常	0.0	2.0
新兴县太平镇显村	潜育型水稻土	粤香粘	23.2	77.0	3.3	0.8	0.0	1.0	0.5	1.0	38.6	11.1	正常	0.0	0.6
新兴县太平镇悦塘村	潜育型水稻土	霸王粘	20.0	74.9	9.8	1.9	0.0	7.3	0.6	0.0	52.2	10.0	正常	0.0	1.2
新兴县东成镇新塘村	潜育型水稻土	粤王粘	21.9	78.0	1.2	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	56.0	12.0	正常	0.0	0.5
罗定市素龙镇赤坎村	潜育型水稻土	竹香粘	19.3	78.7	3.2	0.7	0.0	2.3	0.2	0.0	55.3	10.2	正常	0.0	2.0
罗定市素龙镇赤坎村	潜育型水稻土	华优1179	22.7	80.0	2.7	0.6	0.0	2.0	0.2	0.0	52.6	9.2	正常	0.0	1.2
罗定市罗镜镇镜西村	潜育型水稻土	雪花粘	18.1	75.5	6.8	3.3	0.0	2.5	0.9	0.1	50.9	11.2	正常	0.0	0.4
罗定市罗镜镇镜东村	潜育型水稻土	美香粘2号	18.8	78.4	2.0	0.4	0.0	1.4	0.3	0.0	64.2	11.9	正常	0.0	1.4
罗定市船步镇炉埔村	潜育型水稻土	杂优208	20.5	72.6	14.0	0.8	0.0	5.3	6.5	1.4	32.9	8.5	正常	0.0	1.5
罗定市船步镇炉埔村	潜育型水稻土	野香优莉丝	20.6	74.0	10.7	0.6	0.0	0.8	8.9	0.4	42.1	8.9	正常	0.0	1.9

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
罗定市船步镇船东村	潜育型、丘陵	雪花粘	19.8	79.5	2.2	1.8	0.0	0.3	0.1	0.0	58.7	11.2	正常	0.0	0.5
罗定市船步镇船北村	潜育型、丘陵	雪花粘	18.6	78.8	2.6	1.5	0.0	0.8	0.3	0.0	57.2	11.1	正常	0.0	0.0
罗定市船步镇龙岗村	潜育型、丘陵	雪花粘	20.5	78.4	3.3	2.5	0.0	0.6	0.2	0.0	58.3	11.2	正常	0.0	0.0
罗定市罗镜镇镜东村	潜育型、丘陵	美香粘	20.7	76.6	4.4	2.2	0.0	1.8	0.0	0.4	61.9	10.8	正常	0.0	0.4
罗定市罗镜镇镜西村	潜育型、丘陵	美香粘	22.9	77.2	3.4	2.9	0.0	0.3	0.2	0.0	68.8	11.9	正常	0.0	0.2
罗定市罗镜镇云沙村	潜育型、丘陵	美香粘	24.1	77.6	2.9	1.5	0.0	0.8	0.3	0.3	62.3	12.2	正常	0.0	0.1
罗定市罗镜镇镜坡村	潜育型、丘陵	台山粘	20.6	78.3	3.0	1.8	0.0	0.7	0.5	0.0	72.4	10.7	正常	0.0	0.0
罗定市罗镜镇龙星村	潜育型、丘陵	台山粘	21.8	79.1	2.8	1.4	0.0	1.1	0.3	0.0	58.9	11.2	正常	0.0	0.4
罗定市罗镜镇红光村	潜育型、丘陵	台山粘	19.7	76.3	5.2	2.1	0.1	2.8	0.0	0.3	64.1	10.8	正常	0.0	0.1
罗定市罗平镇山田村	潜育型、丘陵	桂香粘	18.6	80.2	1.6	1.1	0.0	0.3	0.2	0.0	68.2	11.9	正常	0.0	0.0
罗定市罗平镇乌龙村	潜育型、丘陵	美香粘	18.8	79.0	2.6	0.7	0.0	1.9	0.0	0.0	66.7	12.2	正常	0.0	0.4
罗定市罗平镇牛路村	潜育型、丘陵	香丝苗	20.8	78.1	2.2	1.7	0.2	0.3	0.0	0.0	72.5	11.3	正常	0.0	0.4
罗定市罗平镇双莲村	潜育型、丘陵	早杂优	21.7	74.1	7.8	5.4	0.0	1.8	0.6	0.0	69.3	11.5	正常	0.0	0.3
罗定市南塘镇石碑村	潜育型、丘陵	金优粘	24.2	78.8	2.9	1.3	0.0	1.5	0.1	0.0	62.7	11.4	正常	0.0	0.1
罗定市素龙镇赤坎村	潜育型、丘陵	2011	19.2	75.1	6.2	4.1	0.0	1.8	0.0	0.3	57.3	10.2	正常	0.0	0.4
罗定市素龙镇平南村	潜育型、丘陵	五优116	19.9	78.9	2.8	1.8	0.0	0.5	0.5	0.0	60.8	10.7	正常	0.0	0.8
罗定市素龙镇新塘村	潜育型、丘陵	竹香粘	18.5	78.4	6.4	3.7	0.0	2.3	0.4	0.0	69.3	11.6	正常	0.0	0.4
罗定市华石镇马路村	潜育型、丘陵	美香粘	17.6	79.9	2.3	0.6	0.0	1.5	0.2	0.0	70.5	11.3	正常	0.0	0.7
罗定市华石镇三屋村	潜育型、丘陵	澳梗粘	21.3	78.5	3.5	2.8	0.0	0.5	0.0	0.2	65.4	11.2	正常	0.0	0.0
罗定市华石镇莫村	潜育型、丘陵	美香粘	23.4	80.2	2.3	1.2	0.0	1.1	1.0	0.0	71.3	10.4	正常	0.0	0.5
南雄市乌迳镇新田村	渗育型水稻土	早籼稻	21.6	76.0	4.2	2.5	0.4	0.2	1.0	0.1	50.5	12.8	正常	0.0	1.8
南雄市乌迳镇新田村	渗育型水稻土	早籼稻	23.5	76.3	3.8	2.8	0.3	0.2	0.3	0.2	51.0	13.2	正常	0.0	1.7
南雄市乌迳镇新田村	渗育型水稻土	早籼稻	20.8	77.8	3.5	2.6	0.3	0.3	0.2	0.1	51.6	12.5	正常	0.0	2.0
南雄市乌迳镇新田村	潜育型水稻土	早籼稻	22.5	76.5	3.2	2.5	0.2	0.3	0.2	0	49.8	13.0	正常	0.0	1.9
南雄市乌迳镇新田村	潜育型水稻土	早籼稻	23.0	77.8	3.0	2.3	0.2	0.2	0.3	0	52.5	12.3	正常	0.0	1.6
南雄市乌迳镇新田村	潜育型水稻土	早籼稻	23.5	76.1	4.5	2.6	0.6	0.3	0.8	0.2	51.3	12.5	正常	0.0	1.2
南雄市全安镇河塘村	潜育型水稻土	早籼稻	21.3	77.6	3.9	2.3	0.5	0.3	0.7	0.1	53.8	13.3	正常	0.0	1.5
南雄市全安镇河塘村	渗育型水稻土	早籼稻	22.5	76.5	3.5	2.0	0.4	0.5	0.6	0	51.2	13.1	正常	0.0	1.3

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
南雄市全安镇河塘村	渗育型水稻土	早籼稻	23.1	77.9	3.3	1.9	0.5	0.2	0.7	0	50.5	12.1	正常	0.0	1.1
南雄市全安镇河塘村	渗育型水稻土	早籼稻	23.5	76.3	3.0	1.8	0.3	0.4	0.4	0.1	49.8	11.8	正常	0.0	1.3
南雄市全安镇全安村	淹育型水稻土	早籼稻	21.3	77.1	2.8	1.7	0.2	0.3	0.4	0.2	50.8	12.5	正常	0.0	1.1
南雄市全安镇全安村	淹育型水稻土	早籼稻	20.8	76.2	3.4	2.2	0.4	0.2	0.5	0.1	50.3	12.4	正常	0.0	1.5
南雄市全安镇全安村	淹育型水稻土	早籼稻	21.6	78.5	3.2	1.9	0.2	0.3	0.7	0.1	49.9	12.8	正常	0.0	1.4
南雄市全安镇全安村	淹育型水稻土	早籼稻	23.2	77.9	3.3	1.8	0.3	0.4	0.56	0.2	50.5	13.0	正常	0.0	1.7
南雄市油山镇塘岭村	渗育型水稻土	早籼稻	22.3	76.3	4.4	2.5	0.5	0.3	0.9	0.2	51.2	12.5	正常	0.0	1.8
南雄市油山镇上朔村	渗育型水稻土	早籼稻	23.5	77.2	3.2	2.2	0.3	0.3	0.3	0.1	53.3	13.5	正常	0.0	1.7
南雄市油山镇上朔村	渗育型水稻土	早籼稻	19.8	75.8	3.5	2.3	0.2	0.3	0.6	0.1	50.3	12.6	正常	0.0	1.4
南雄市油山镇上朔村	渗育型水稻土	早籼稻	22.2	76.4	3.6	2.4	0.3	0.2	0.5	0.2	49.2	11.9	正常	0.0	1.8
南雄市油山镇延村村	渗育型水稻土	早籼稻	23.5	77.5	2.9	1.9	0.4	0.3	0.2	0.1	50.8	12.6	正常	0.0	1.6
南雄市油山镇莲山村	渗育型水稻土	早籼稻	20.1	76.7	3.2	2.1	0.3	0.2	0.6	0	50.3	12.3	正常	0.0	1.3
罗定市生江镇八达村	潜育型、丘陵	威良1173	21.0	78.3	4.0	1.1	0.0	0.3	2.6	0.0	56.6	9.6	正常	0.0	0.2
罗定市生江镇里午村	潜育型、丘陵	什优	21.9	79.0	3.4	1.4	0.0	2.0	0.0	0.0	59.8	8.9	正常	0.0	1.2
罗定市太平镇潭白村	潜育型、丘陵	美香粘	23.0	77.8	3.1	1.8	0.0	1.3	0.0	0.0	56.0	9.0	正常	0.0	1.0
罗定市太平镇太东村	潜育型、丘陵	杂优2156	19.0	78.1	4.3	2.5	0.0	1.8	0.0	0.0	61.9	10.0	正常	0.0	0.5
罗定市围底镇五华村	潜育型、丘陵	澳丝粘	20.2	77.7	3.6	0.7	0.0	2.9	0.0	0.0	55.8	8.8	正常	0.0	1.0
罗定市围底镇城围村	潜育型、丘陵	美香粘	20.5	78.5	2.5	2.1	0.0	0.4	0.0	0.0	58.3	9.3	正常	0.0	1.3
罗定市船步镇船北村	潜育型、丘陵	椰香优美丝	19.8	77.4	2.5	0.9	0.0	0.9	0.5	0.2	58.7	8.8	正常	0.0	0.6
罗定市船步镇船北村	潜育型、丘陵	美香粘	18.5	80.3	1.4	1.1	0.0	0.3	0.0	0.0	69.3	9.0	正常	0.0	0.8
罗定市罗镜镇镜西村	潜育型、丘陵	雪花粘	23.7	77.3	5.5	4.1	0.0	1.3	0.0	0.1	58.9	10.5	正常	0.0	0.3
罗定市罗镜镇镜东村	潜育型、丘陵	美香粘	22.6	77.6	3.4	2.2	0.0	1.0	0.2	0.0	57.2	10.3	正常	0.0	1.4
罗定市苹塘镇周沙村	潜育型、丘陵	美香粘	18.8	80.1	1.6	0.7	0.0	0.9	0.0	0.0	69.0	10.2	正常	0.0	0.7
罗定市罗平镇替阳扩光村	潜育型、丘陵	香粘	20.6	78.0	4.5	2.4	0.0	2.1	0.0	0.0	55.6	8.7	正常	0.0	0.9
罗定市罗平镇替北蓆塘村	潜育型、丘陵	美香粘	19.0	78.3	1.2	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	68.8	10.1	正常	0.0	1.4
罗定市茜塘镇石碑村	潜育型、丘陵	软华优	23.1	79.1	2.0	0.5	0.0	1.5	0.0	0.0	66.6	10.7	正常	0.0	2.0
罗定市茜塘镇石碑村	潜育型、丘陵	2011	23.6	75.1	8.9	6.0	0.0	2.4	0.2	0.3	61.5	10.2	正常	0.0	0.4
罗定市素龙镇赤坎村	潜育型、丘陵	五优116	23.8	80.2	5.0	4.3	0.0	0.5	0.2	0.0	61.4	9.8	正常	0.0	1.0

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
罗定市素龙镇赤坎村	潜育型、丘陵	竹香粘	20.8	79.0	2.1	1.0	0.0	1.1	0.0	0.0	64.4	9.0	正常	0.0	2.2
罗定市华石镇荔枝大木塘	潜育型、丘陵	野香优利丝	21.7	80.0	1.4	0.6	0.0	0.8	0.0	0.0	62.8	10.8	正常	0.0	1.1
罗定市华石镇荔枝大木塘	潜育型、丘陵	杂优	24.2	80.5	5.3	4.9	0.0	0.2	0.0	0.2	59.2	11.2	正常	0.0	0.3
罗定市苹塘镇周沙村	潜育型、丘陵	软粘	19.2	78.6	3.7	1.2	0.0	1.5	1.0	0.0	67.8	10.4	正常	0.0	0.8
潮阳	淹育型水稻土	杂优大粒	22.4	77.9	2.4	0.4	0.0	0.7	0.8	0.5	49.2	13.5	正常	0.0	1.5
潮阳	淹育型水稻土	杂优细粒	21.3	80.6	1.4	0.2	0.0	0.3	0.6	0.3	62.7	13.6	正常	0.0	1.1
潮阳	淹育型水稻土	小珍珠	20.5	77.4	2.1	0.2	0.1	0.4	1.1	0.3	54.3	13.7	正常	0.0	0.5
潮阳	淹育型水稻土	深优9516	24.7	76.9	1.8	0.2	0.0	0.6	0.9	0.1	55.2	13.2	正常	0.0	1.6
潮阳	淹育型水稻土	竹香	20.1	79.2	1.7	0.6	0.0	0.2	0.7	0.2	60.1	13.6	正常	0.0	0.4
潮阳	淹育型水稻土	竹香	26.1	80.7	1.4	0.2	0.0	0.6	0.5	0.1	50.7	13.5	正常	0.0	0.9
潮阳	淹育型水稻土	汕优	21.3	81.6	1.4	0.1	0.0	0.3	0.4	0.2	46.7	12.9	正常	0.0	1.6
潮阳	淹育型水稻土	深优6516	27.5	77.4	0.7	0.1	0.0	0.1	0.3	0.2	65.8	13.9	正常	0.0	0.8
潮阳	淹育型水稻土	小珍珠	24.3	77.6	1.0	0.1	0.0	0.5	0.2	0.2	57.2	13.4	正常	0.0	1.7
潮阳	淹育型水稻土	特青	24.9	76.8	1.6	0.1	0.0	0.6	0.6	0.3	52.7	12.7	正常	0.0	1.8
潮阳	淹育型水稻土	深优9716	21.1	79.2	1.8	0.1	0.0	0.4	0.5	0.2	55.3	12.9	正常	0.0	0.9
潮阳	淹育型水稻土	v酿3089	25.4	77.6	1.1	0.1	0.0	0.5	0.4	0.1	64.9	13.0	正常	0.0	1.7
潮阳	淹育型水稻土	美香粘2号	22.1	78.6	1.0	0.1	0.0	0.3	0.3	0.3	53.7	12.9	正常	0.0	1.4
潮阳	淹育型水稻土	香米	21.6	79.5	0.9	0.1	0.0	0.5	0.2	0.1	64.6	13.6	正常	0.0	0.3
潮南	渗育型水稻土	早短524	22.2	78.0	1.6	0.2	0.0	0.7	0.6	0.1	60.7	13.7	正常	0.0	0.7
潮南	渗育型水稻土	丝苗	23.7	78.1	1.3	0.1	0.0	0.3	0.6	0.3	49.5	14.2	正常	0.0	1.8
潮南	渗育型水稻土	丝苗	24.8	76.8	1.8	0.0	0.0	1.1	0.3	0.1	47.2	13.7	正常	0.0	1.1
潮南	渗育型水稻土	深优9716	21.3	77.5	0.4	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	60.1	13.9	正常	0.0	1.0
潮南	渗育型水稻土	深优9716	21.8	79.3	1.7	0.3	0.0	0.8	0.6	0.0	53.1	13.2	正常	0.0	0.9
潮南	渗育型水稻土	早短524	21.9	82.4	1.9	0.4	0.0	0.9	0.2	0.4	64.8	13.7	正常	0.0	1.8
兴宁	/	十九香	22.1	77.1	0.6	0.1	0.0	0.3	0.0	0.2	44.7	13.5	正常	0.0	0.5
五华	/	杂优	20.9	80.1	1.2	0.2	0.0	0.5	0.2	0.3	59.2	13.2	正常	0.0	1.2
五华	/	美芭香粘	19.4	77.3	1.2	0.4	0.1	0.5	0.0	0.2	48.8	13.3	正常	0.0	0.8
五华	/	杂优	22.6	79.4	1.4	0.1	0.3	0.4	0.2	0.4	60.1	13.0	正常	0.0	1.6

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
兴宁	/	常规	22.4	78.5	0.7	0.1	0.0	0.4	0.0	0.2	55.6	13.4	正常	0.0	0.5
兴宁	/	常规	18.7	76.9	1.8	0.4	0.3	0.8	0.2	0.1	50.2	13.0	正常	0.0	1.1
兴宁	/	杂优	20.5	77.8	1.7	0.3	0.1	0.9	0.2	0.2	59.3	13.6	正常	0.0	1.4
兴宁	/	美香粘	20.7	76.2	1.1	0.3	0.0	0.6	0.0	0.2	42.8	13.1	正常	0.0	0.6
兴宁	/	杂优	21.8	77.4	1.4	0.4	0.0	0.7	0.1	0.3	61.2	13.7	正常	0.0	0.9
兴宁	/	竹香粘	21.4	77.3	1.6	0.3	0.0	0.7	0.0	0.6	48.3	13.1	正常	0.0	1.2
兴宁	/	隆优3206	21.1	77.9	0.6	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	48.6	12.9	正常	0.0	1.6
兴宁	/	耕香优	20.6	78.2	1.1	0.4	0.0	0.5	0.1	0.1	62.3	13.5	正常	0.0	1.1
兴宁	/	常规	21.7	78.0	1.2	0.4	0.0	0.3	0.4	0.1	47.5	13.3	正常	0.0	0.9
兴宁	/	南晶香粘	22.3	76.3	1.8	0.3	0.0	1.3	0.0	0.2	51.3	13.7	正常	0.0	0.5
蕉岭	/	杂优	21.7	78.3	2.0	0.3	0.0	1.4	0.0	0.3	55.7	13.2	正常	0.0	1.4
蕉岭	/	粤禾丝苗	21.5	77.7	2.1	0.2	0.1	1.2	0.3	0.3	46.4	12.7	正常	0.0	1.0
蕉岭	/	杂优	23.7	80.5	2.3	0.2	0.2	1.0	0.7	0.2	60.5	12.6	正常	0.0	1.1
蕉岭	/	深优9708	22.5	77.6	1.3	0.7	0.0	0.3	0.2	0.1	51.0	13.4	正常	0.0	0.5
蕉岭	/	杂优	22.9	79.5	1.5	0.4	0.0	0.5	0.4	0.2	65.4	13.6	正常	0.0	1.6
蕉岭	/	恒丰优1179	23.0	77.6	2.1	0.6	0.0	1.1	0.3	0.1	44.2	13.4	正常	0.0	1.2
斗门区白蕉镇丰洲村	淹育型水稻土	稻粘	20.0	77.1	3.7	1.9	0	1.5	0.1	0.3	45.1	12.8	正常	0	0.3
斗门区白蕉镇丰洲村	淹育行水稻土	白壳粘	20.7	77.0	3.3	1.8	0	1.3	0.2	0	57.0	9.8	正常	0	0.2
斗门区白蕉镇丰洲村	淹育行水稻土	籼小粘	22.0	77.7	3.1	1.3	0	1.6	0.2	0	62.8	17.1	正常	0	0.9
斗门区白蕉镇丰洲村	淹育行水稻土	纤新粘	21.0	78.6	3.1	0.6	0	2.4	0.1	0	47.6	7.4	正常	0	0.7
斗门区白蕉镇丰洲村	淹育行水稻土	小农粘	20.0	77.7	4.5	0.3	0	3.7	0.5	0	53.1	10.7	正常	0	1.6
斗门区白蕉镇鳌鱼沙村	淹育行水稻土	籼小粘	19.1	79.5	1.1	0.9	0	0.1	0.1	0	58.7	8.8	正常	0	0.9
斗门区白蕉镇鳌鱼沙村	淹育行水稻土	象牙粘	18.8	75.9	1.0	0.8	0	0.2	0	0	55.5	9.5	正常	0	1.5
斗门区白蕉镇鳌鱼沙村	淹育行水稻土	优粘	18.9	75.0	0.9	0.8	0	0.1	0	0	49.3	8.6	正常	0	0.9
斗门区白蕉镇鳌鱼沙村	淹育行水稻土	新丝苗	20.2	75.5	1.6	1.4	0	0.2	0	0	50.7	11.3	正常	0	0.8
斗门区白蕉镇南澳村	淹育行水稻土	新早粘	20.0	78.8	1.6	0.3	0	1.3	0	0	56.2	9.6	正常	0	0.8
斗门区白蕉镇南澳村	淹育型水稻土	19香	20.7	79.0	0.8	0.1	0	0.7	0	0	41.5	7.7	正常	0	2
斗门区白蕉镇南澳村	淹育行水稻土	黄壳粘	19.8	77.3	1.5	0.6	0	0.8	0	0	57.5	11.4	正常	0	0.3

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
斗门区白蕉镇盖山村	淹育行水稻土	丝苗粘	19.6	78.8	1.2	0.1	0	1.1	0	0	55.8	8.6	正常	0	0.5
斗门区白蕉镇盖山村	淹育行水稻土	香粘	20.4	76.9	4.0	0.3	0	3.7	0	0	49.7	8.7	正常	0	1
斗门区白蕉镇盖山村	淹育行水稻土	青粘2号	22.2	76.4	3.1	0.4	0	2.8	0	0	39.3	12.2	正常	0	0.9
斗门区莲洲镇广丰村	淹育行水稻土	丝苗	21.3	77.0	2.6	2.3	0	0.3	0	0	58.9	8.6	正常	0	1.1
斗门区莲洲镇福安村	淹育行水稻土	象牙占	19.7	78.3	1.8	0.9	0	1.0	0	0	59.8	11.4	正常	0	0.1
斗门区莲洲镇围头村	淹育行水稻土	丝苗粘	20.2	74.4	0.8	0.8	0	0	0	0	48.9	12.6	正常	0	0.3
斗门区莲洲镇耕管村	淹育行水稻土	美雪占	17.9	73.7	2.7	2.2	0	0.5	0	0	53.2	10.7	正常	0	0.9
斗门区莲洲镇耕管村	淹育行水稻土	丝苗占	18.6	76.9	4.0	0.8	0	3.2	0	0	51.5	11.3	正常	0	0.9
梅县区梅西镇幸福村	潴育型	丝苗米	26.8	77.2	3.4	0.3	0.4	1.4	0.7	0.1	57.0	12.1	正常	/	/
梅县区梅西镇丰田村	潴育型	深优9514	21.6	80.1	2.2	0.8	0.4	0.6	0.3	0.1	48.2	12.0	正常	/	/
梅县区梅西镇崇花村	潴育型	济优6377	24.8	76.2	2.5	0.4	0.6	0.8	0.1	0.2	47.3	11.9	正常	/	/
梅县区梅西镇石赖村	潴育型	深两优867	24.1	75.3	3.9	0.8	0.5	1.1	0.5	0.3	49.6	12.3	正常	/	/
梅县区梅西镇白面村	潴育型	泰优98	24.2	77.2	2.7	0.6	0.6	0.9	0.1	0.0	46.4	12.2	正常	/	/
梅县区大坪镇上和村	潴育型	恒丰优郁香	26.2	77.6	2.6	1.1	0.2	0.9	0.2	0.2	48.3	12.5	正常	/	/
梅县区大坪镇平中村	潴育型	梦两优黄莉占	28.7	78.3	4.2	1.4	0.6	1.0	0.3	0.2	52.3	12.4	正常	/	/
梅县区大坪镇汤湖村	潴育型	五优1179	25.1	78.2	2.9	0.5	0.2	1.0	0.4	0.3	49.7	12.3	正常	/	/
梅县区大坪镇雷甘村	潴育型	隆品优1706	28.2	77.6	2.6	1.1	0.2	0.9	0.2	0.2	46.9	12.6	正常	/	/
梅县区大坪镇三台村	潴育型	恒丰优718	25.6	76.6	2.9	0.5	0.2	1.0	0.4	0.3	49.7	12.0	正常	/	/
梅县区南口镇龙塘村	潴育型	恒丰优郁香	24.6	76.1	2.6	1.1	0.2	0.9	0.2	0.2	47.6	11.9	正常	/	/
梅县区南口镇白叶村	潴育型	恒丰优郁香	24.8	75.9	3.4	0.3	0.4	1.4	0.7	0.1	47.2	12.3	正常	/	/
梅县区南口镇车陂村	潴育型	梦两优黄莉占	26.8	77.1	2.2	0.8	0.4	0.6	0.3	0.1	48.2	12.0	正常	/	/
梅县区南口镇瑶尾村	潴育型	梦两优黄莉占	27.2	78.6	3.4	1.1	0.4	0.8	0.3	0.2	47.3	12.6	正常	/	/
梅县区雁洋镇东洲村	潴育型	山优9583	25.3	76.5	3.9	0.8	0.5	1.1	0.5	0.3	47.2	11.8	正常	/	/
梅县区雁洋镇坝头村	潴育型	恒丰优718	22.9	76.8	2.6	1.1	0.2	0.9	0.2	0.2	47.5	12.3	正常	/	/
梅县区雁洋镇文沙村	潴育型	恒丰优718	24.6	77.4	3.4	0.3	0.4	1.4	0.7	0.1	46.5	12.3	正常	/	/
梅县区雁洋镇东洲村	潴育型	Y俩优1378	25.3	78.2	2.9	0.5	0.2	1.0	0.4	0.3	48.3	12.3	正常	/	/
梅县区丙村镇芦陵村	潴育型	山优9798	26.4	75.6	2.5	0.4	0.6	0.8	0.1	0.2	48.6	12.8	正常	/	/
梅县区丙村镇红光村	潴育型	徽优3089	26.8	75.2	2.7	0.6	0.6	0.9	0.1	0.0	46.4	12.2	正常	/	/

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
仁化县长江镇	平原渗育型	金早47	24.6	75.4	15.8	14.3	0.0	1.5	0.0	0.0	54.2	9.2	正常	0.0	0.4
始兴县顿岗镇	平原淹育型	中早39	22.1	79.2	5.2	2.9	0.0	0.7	1.7	0.0	12.4	10.1	正常	0.0	1.5
南雄市黄坑罗坑	丘陵渗育型	象牙粘	22.3	77.0	5.3	1.5	0.0	2.8	1.2	0.0	54.9	11.6	正常	0.0	3.2
始兴县太平瑶村	平原潜育型	杂交618	23.5	75.6	9.5	8.8	0.0	0.6	0.0	0.0	31.0	10.2	正常	0.1	0.8
始兴县沈所镇兴仁村	丘陵潜育型	竹稻	17.3	75.7	9.8	8.4	0.0	1.5	0.0	0.0	51.0	9.5	正常	0.0	1.1
始兴县城南镇杨公岭	平原潜育型	美香粘	18.3	74.6	9.4	7.3	0.0	2.0	0.0	0.0	38.1	9.2	正常	0.1	0.1
始兴县顿岗镇寨头村	平原盐渍型	美香粘	18.1	78.4	2.9	0.8	0.0	1.2	0.8	0.0	45.3	10.5	正常	0.0	0.4
始兴县顿岗镇寨头村	平原盐渍型	白壳粘	19.7	75.9	11.0	8.7	0.0	0.8	1.5	0.0	40.8	11.0	正常	0.0	0.3
始兴县城南镇新村	平原盐渍型	白壳粘	18.6	79.1	2.6	0.8	0.1	1.4	0.3	0.0	42.9	10.5	正常	0.0	0.5
始兴县马市高水村	平原渗育型	美香粘	16.0	73.2	8.6	6.3	0.0	2.3	0.0	0.0	50.2	9.5	正常	0.0	0.3
翁源县江尾镇联益村	丘陵渗育型	珍桂	20.0	79.9	4.0	3.8	0.0	0.2	0.0	0.0	50.3	8.4	正常	0.0	0.2
翁源县龙仙镇沙坪村	丘陵渗育型	五优1179	23.5	80.8	2.4	1.4	0.1	0.6	0.2	0.0	36.7	11.3	正常	0.0	1.9
翁源县龙仙镇丰山村	丘陵渗育型	丰泰优208	23.0	78.8	5.6	4.3	0.0	1.2	0.0	0.0	49.7	10.9	正常	0.0	0.4
翁源县周陂镇阳东村	丘陵渗育型	珍桂	18.0	77.0	6.9	6.7	0.0	0.2	0.0	0.0	56.5	9.8	正常	0.0	0.5
翁源县江尾镇径丰村	丘陵渗育型	珍桂	19.1	77.7	6.6	5.4	0.0	1.1	0.1	0.0	57.4	12.5	正常	0.0	1.4
仁化县扶溪乡扶中村	山区淹育型	深优9516	23.7	75.9	9.6	9.0	0.0	0.6	0.0	0.0	49.4	10.8	正常	0.0	0.3
仁化县扶溪乡紫岭村	山区淹育型	竹稻	15.6	75.8	7.7	4.2	0.5	2.5	0.4	0.0	43.5	8.2	正常	0.0	0.7
仁化县扶溪乡紫岭村	山区淹育型	常规种78	24.7	75.9	5.5	2.9	0.5	1.1	1.0	0.0	48.8	11.0	正常	0.0	1.4
仁化县扶溪乡紫岭村	山区淹育型	大优	27.1	77.8	4.5	3.0	0.1	1.2	0.2	0.0	54.5	9.4	正常	0.0	0.6
仁化县扶溪乡扶中村	山区淹育型	蔡优208	25.4	74.5	8.1	7.4	0.1	0.6	0.0	0.0	43.6	8.0	正常	0.0	0.3
高明区山底村	/	姜香粘	19.1	76.0	9.4	0.1	0.0	6.7	2.5	0.1	59.8	9.1	正常	0.0	1.9
高明区山底村	/	粤黄丝苗	20.4	72.8	10.5	0.7	0.0	2.9	6.9	0.0	56.1	9.1	正常	0.0	0.6
高明区罗稳村	/	1号稻谷	20.1	76.3	6.1	1.0	0.0	1.7	3.4	0.0	62.7	9.5	正常	0.0	0.8
高明区罗稳村	/	象牙丝苗	21.5	68.4	5.3	1.6	0.0	2.3	1.4	0.0	50.9	9.3	正常	0.0	0.7
高明区罗稳村	/	象牙粘	20.8	76.7	5.6	0.3	0.0	2.6	2.7	0.0	61.9	10.4	正常	0.0	0.5
高明区罗稳村	/	象牙丝苗	21.9	74.9	7.7	1.6	0.0	4.2	1.9	0.0	55.9	8.8	正常	0.0	0.6
高明区罗稳村	/	丰香一号丝苗	20.3	75.8	2.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	58.6	10.4	正常	0.0	0.4
高明区罗稳村	/	象牙丝苗	22.5	73.7	7.5	2.3	0.0	2.8	2.4	0.0	57.6	10.6	正常	0.0	0.4

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
高明区深水村	/	佛山丝苗	20.8	70.3	14.2	0.1	0.0	2.4	11.7	0.0	47.3	9.1	正常	0.0	0.9
高明区山底村	/	象牙粘	18.8	76.2	5.8	0.6	0.0	1.5	3.7	0.0	54.1	10.5	正常	0.0	0.5
高明区山底村	/	象牙粘	21.3	71.9	11.7	0.2	0.0	3.7	7.4	0.4	53.1	8.8	正常	0.0	0.8
高明区罗稳村	/	美香粘	18.4	75.8	4.4	1.1	0.0	2.3	1.0	0.0	51.0	10.2	正常	0.0	0.8
高明区罗稳村	/	象牙粘	21.1	78.0	3.5	1.4	0.0	0.7	1.4	0.0	63.0	10.3	正常	0.0	0.6
高明区罗稳村	/	象牙粘	20.2	76.5	3.5	0.8	0.0	1.5	1.2	0.0	56.6	9.6	正常	0.0	0.9
高明区深水村	/	丝苗	21.2	78.3	2.5	0.3	0.0	1.2	1.0	0.0	51.7	8.5	正常	0.0	0.8
高明区深水村	/	象牙粘	18.4	77.2	3.8	0.6	0.0	2.0	1.2	0.0	57.1	8.9	正常	0.0	1.0
高明区罗稳村	/	象牙粘	21.1	76.3	6.3	1.8	0.0	1.4	3.1	0.0	59.3	10.4	正常	0.0	0.3
高明区罗稳村	/	象牙粘	19.3	72.5	6.2	2.0	0.0	1.5	2.7	0.0	59.0	16.7	正常	0.0	0.2
高明区罗稳村	/	象牙丝苗	22.1	73.1	9.3	0.7	0.0	4.7	3.9	0.0	52.6	12.7	正常	0.0	1.3
高明区石塘村	/	农晶丝苗	21.3	77.7	3.4	0.6	0.0	1.7	1.1	0.0	64.6	10.0	正常	0.0	0.3
徐闻县迈陈镇青桐村		博优	25.1	75.5	1.1	0.6	0.3	0.3	0	0	45	10.8	正常	0	0.7
徐闻县迈陈镇青桐村		博优	26.3	76	0.9	0.5	0.2	0.2	0	0	47	11.3	正常	0	1.2
徐闻县迈陈镇青桐村		博优	25	76	0.6	0.3	0.1	0.1	0	0	44	11.7	正常	0	1.6
徐闻县迈陈镇青桐村		博优	25	77	0.4	0.2	0.1	0.1	0	0	45	11.7	正常	0	1.6
徐闻县下桥镇六片田村		博优	27.4	79	0.7	0.2	0.3	0.2	0	0	50	12.7	正常	0	1.2
徐闻县下桥镇六片田村		博优	26.7	77	0.6	0.1	0.3	0.1	0	0	46	12.3	正常	0	1.2
徐闻县城北乡大黄村		博优	24.6	77	0.6	0.2	0.3	0.1	0	0	47	12.3	正常	0	1.3
徐闻县城北乡大黄村		博优	24.3	77	0.8	0.5	0.2	0.1	0	0	52.3	12.7	正常	0	1.3
徐闻县城北乡那种村		博优	27	75.3	1	0.3	0.3	0.3	0	0	46.3	13.1	正常	0	1.3
徐闻县城北乡那种村		博优	25.5	76.4	1	0.3	0.4	0.3	0	0	46.1	12.7	正常	0	1.5
徐闻县下桥镇六片田村		博优	24.6	77.1	0.8	0.5	0.2	0.1	0	0	51.3	12.7	正常	0	1.3
徐闻县迈陈镇打银村		博优	24.5	77.4	1.1	0.4	0.3	0.2	0	0	51.4	12.5	正常	0	1.5
徐闻县城北乡那松村		博优	24.7	77.4	0.9	0.5	0.3	0.2	0	0	44	11.7	正常	0	1.3
徐闻县城北乡那松村		博优	25.1	77	0.7	0.3	0.3	0.1	0	0	51.3	12.3	正常	0	1.5
徐闻县迈陈镇龙潭村		博优	24.1	75.2	0.9	0.5	0.2	0.1	0	0	48	12.8	正常	0	1.6
徐闻县城北乡后坡寮村		博优	23.7	76.5	0.8	0.4	0.2	0.2	0	0	51.3	13.1	正常	0	1.3

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
徐闻县城北乡后坡寮村		博优	23.8	76.3	0.8	0.4	0.2	0.2	0	0	51.6	12.7	正常	0	1.6
徐闻县城北乡后坡寮村		博优	23.8	75.6	0.8	0.3	0.2	0.2	0	0	48.9	12.3	正常	0	1.2
徐闻县迈陈镇峙头村		博优	26.3	77.1	0.8	0.4	0.2	0.2	0	0	50.6	13.1	正常	0	1.3
徐闻县迈陈镇峙头村		博优	24.3	75.7	0.7	0.3	0.2	0.2	0	0	51.3	12.7	正常	0	1.5
南朗崖口村	/	19香	20.8	71.1	5.6	4.8	0.0	0.0	0.8	0.0	48.9	13.6	正常	0.0	1.2
南朗崖口村	/	金农丝苗	21.1	73.9	4.9	4.7	0.0	0.1	0.1	0.0	50.1	13.6	正常	0.0	1.4
南朗冲口村	/	五星丝苗	19.9	78.0	3.1	2.0	0.0	0.1	1.0	0.0	62.3	12.3	正常	0.0	0.8
南朗冲口村	/	象牙香占	19.4	68.3	1.8	1.5	0.0	0.3	0.0	0.0	53.3	13.4	正常	0.0	0.9
大涌叠石村	/	美香占2号	22.8	75.8	3.5	2.7	0.0	0.8	0.0	0.0	64.4	12.5	正常	0.0	1.0
大涌叠石村	/	象牙香占	22.2	76.1	1.0	0.6	0.0	0.2	0.2	0.0	67.1	12.8	正常	0.0	0.6
沙溪虎胜村	/	美香占2号	21.5	77.3	2.0	0.5	0.0	0.8	0.7	0.0	66.7	12.8	正常	0.0	0.4
沙溪圣狮村	/	19香	21.3	75.8	4.3	3.5	0.0	0.5	0.3	0.0	49.2	13.0	正常	0.0	0.8
板芙寿围村	/	新农稻1号	22.1	75.5	1.6	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0	61.4	14.9	正常	0.0	0.4
横栏横东村	/	美香占2号	20.6	76.4	3.0	2.4	0.0	0.6	0.0	0.0	60.5	9.2	正常	0.0	0.6
横栏四沙村	/	美香占2号	21.4	76.3	2.4	2.0	0.0	0.4	0.0	0.0	59.6	12.8	正常	0.0	0.6
横栏四沙村	/	象牙香占	20.6	77.0	2.8	2.1	0.0	0.7	0.0	0.0	56.0	12.5	正常	0.0	0.4
黄埔永平村	/	珍珠米	22.2	77.7	1.7	1.4	0.0	0.3	0.0	0.0	56.7	9.1	正常	0.0	0.4
黄埔横档村	/	白壳占	18.9	77.5	1.7	1.2	0.0	0.3	0.2	0.0	60.4	10.2	正常	0.0	0.8
黄埔横档村	/	黄壳占	19.4	77.3	2.9	2.0	0.0	0.9	0.0	0.0	59.2	11.6	正常	0.0	1.2
黄埔横档村	/	美香占2号	20.4	76.2	2.6	1.8	0.0	0.4	0.4	0.0	60.4	13.0	正常	0.0	0.6
黄埔鳌山村	/	象牙香占	20.4	75.6	3.0	1.8	0.0	1.2	0.0	0.0	55.5	12.5	正常	0.0	0.4
港口胜隆村	/	南晶香占	22.1	78.3	2.4	0.4	0.0	1.6	0.4	0.0	51.2	11.1	正常	0.0	0.8
港口西街村	/	广西杂优	22.0	78.9	1.1	0.9	0.0	0.2	0.0	0.0	62.0	9.4	正常	0.0	0.6
港口群乐村	/	19香	21.1	77.5	1.2	0.4	0.0	0.8	0.0	0.0	57.9	10.4	正常	0.0	0.4
始兴县马市镇柴塘村	粤北地区	象牙粘	19.2	75.8	2.2	0.5	0.9	0.6	0.2	0.0	56.7	11.5	正常	0.2	0.7
始兴县马市镇高水村	粤北地区	美香粘	20.1	76.1	3.5	1.0	1.1	0.9	0.5	0.0	60.1	13.2	正常	0.4	0.4
始兴县马市镇堂阁村	粤北地区	美香粘	20.3	75.7	3.2	1.5	0.6	0.4	0.7	0.0	63.1	13.2	正常	0.3	0.5
始兴县马市镇黄田村	粤北地区	象牙粘	19.0	75.0	2.6	1.4	0.9	0.2	0.1	0.0	66.4	13.0	正常	0.1	1.0

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
始兴县马市镇联俄村	粤北地区	美香粘	20.5	76.8	2.7	1.3	0.6	0.2	0.4	0.2	61.9	12.4	正常	0.2	0.9
始兴县马市镇陆源村	粤北地区	美香粘	20.2	77.6	3.1	1.4	0.4	0.8	0.5	0.0	66.1	11.9	正常	0.3	0.5
始兴县马市镇坵坪村	粤北地区	美香粘	20.6	75.3	4.0	1.0	1.8	0.8	0.4	0.0	64.8	12.8	正常	0.2	0.8
始兴县马市镇洸洲水村	粤北地区	美香粘	19.7	78.6	3.6	1.5	0.9	0.1	0.8	0.3	66.6	13.0	正常	0.1	0.4
始兴县马市镇远送村	粤北地区	美香粘	19.1	75.4	2.4	1.6	0.2	0.5	0.1	0.0	64.2	13.2	正常	0.3	1.1
始兴县马市镇赤谷村	粤北地区	美香粘	20.1	78.1	3.7	1.7	0.4	1.0	0.6	0.0	66.5	12.6	正常	0.2	0.9
始兴县马市镇都塘村	粤北地区	美香粘	20.7	76.8	3.9	1.4	0.6	0.9	1.0	0.0	63.1	13.0	正常	0.5	0.7
始兴县马市镇高水村	粤北地区	象牙粘	18.7	75.4	2.8	1.5	0.4	0.6	0.3	0.0	65.7	12.5	正常	0.3	1.2
始兴县马市镇破田村	粤北地区	美香粘	20.3	76.7	2.9	1.6	0.8	0.1	0.4	0.0	66.4	13.1	正常	0.1	0.5
始兴县马市镇安水村	粤北地区	美香粘	20.4	78.6	3.0	1.6	0.1	0.3	0.9	0.1	62.4	12.9	正常	0.2	1.4
始兴县马市镇犁梨村	粤北地区	美香粘	19.8	74.9	3.9	1.5	0.8	0.9	0.7	0.0	65.8	12.6	正常	0.1	0.8
始兴县马市镇太原村	粤北地区	美香粘	19.0	76.8	3.4	1.4	0.4	0.7	0.9	0.0	63.6	12.5	正常	0.2	1.3
始兴县马市镇堂阁村	粤北地区	象牙粘	18.1	75.1	4.1	2.1	0.5	0.3	0.8	0.4	66.7	12.1	正常	0.1	0.6
始兴县马市镇黄田村	粤北地区	美香粘	19.9	77.8	3.2	1.5	0.7	0.8	0.2	0.0	65.4	11.9	正常	0.4	0.9
始兴县马市镇柴塘村	粤北地区	美香粘	20.6	78.6	3.1	1.4	0.9	0.2	0.6	0.0	66.3	12.8	正常	0.1	1.1
始兴县马市镇联俄村	粤北地区	美香粘	19.7	76.4	3.6	1.3	0.6	0.4	0.7	0.6	65.7	11.9	正常	0.3	0.7
增城区朱村镇朱村村	淹育型水稻土	美香粘谷	18.8	68.7	17.3	0.2	0.0	15.6	0.0	1.5	50.8	11.4	正常	0.0	3.2
增城区朱村镇朱村村	淹育型水稻土	美香粘谷	18.6	69.3	16.9	0.1	0.0	15.4	0.0	1.4	51.1	11.4	正常	0.0	3.0
增城区派潭镇湓汾村	淹育型水稻土	美香粘谷	19.0	69.0	17.0	0.0	0.2	15.1	0.0	1.7	50.9	11.5	正常	0.0	2.9
增城区朱村镇南岗村	淹育型水稻土	广发丝苗谷	20.3	72.3	13.2	0.4	0.0	12.2	0.0	0.6	50.6	11.6	正常	0.1	1.7
增城区朱村镇南岗村	淹育型水稻土	广发丝苗谷	20.2	72.6	12.7	0.3	0.0	12.0	0.0	0.4	50.7	11.5	正常	0.0	1.5
增城区朱村镇南岗村	淹育型水稻土	广发丝苗谷	20.5	72.2	13.0	0.1	0.0	12.4	0.0	0.5	50.2	11.8	正常	0.1	1.6
增城区派潭镇石头村	淹育型水稻土	珍桂矮谷	24.1	78.6	5.4	1.4	0.0	3.8	0.0	0.0	55.9	12.3	正常	0.0	0.5
增城区派潭镇石头村	淹育型水稻土	珍桂矮谷	24.4	78.8	5.1	0.0	0.0	3.6	0.1	0.0	56.2	12.0	正常	0.0	0.8
增城区派潭镇汉湖村	淹育型水稻土	美香粘谷	17.7	72.9	9.8	0.0	0.0	8.9	0.0	0.9	51.5	11.0	正常	0.0	1.1
增城区派潭镇汉湖村	淹育型水稻土	美香粘谷	18.0	73.1	9.5	0.1	0.0	8.7	0.0	0.7	51.0	11.2	正常	0.0	0.9
增城区派潭镇派潭村	淹育型水稻土	美香粘谷	17.9	73.0	9.6	0.0	0.0	8.9	0.0	0.7	50.8	11.0	正常	0.0	0.8
增城区派潭镇湓汾村	淹育型水稻土	美香粘谷	19.0	73.8	10.2	0.2	0.0	9.7	0.0	0.3	51.3	11.4	正常	0.1	1.0

2022年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
增城区派潭镇派潭村	淹育型水稻土	美香粘谷	20.1	74.0	11.5	0.3	0.0	10.8	0.0	0.4	52.0	12.0	正常	0.1	1.5
增城区派潭镇派潭村	淹育型水稻土	丰两优谷	27.5	74.3	10.0	3.0	0.0	7.0	0.0	0.0	52.6	13.3	正常	0.1	1.1
增城区派潭镇湓汾村	淹育型水稻土	丰两优谷	27.0	74.5	10.4	1.7	0.0	8.3	0.0	0.2	50.7	12.5	正常	0.0	1.4
增城区派潭镇旧高埔村	淹育型水稻土	三二矮谷	20.2	80.2	2.6	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	62.5	11.3	正常	0.0	1.9
增城区派潭镇旧高埔村	淹育型水稻土	三二矮谷	20.0	80.0	2.3	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	62.0	11.6	正常	0.0	1.7
增城区派潭镇旧高埔村	淹育型水稻土	三二矮谷	19.5	79.4	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	62.1	11.4	正常	0.0	1.3
增城区派潭镇高埔村	淹育型水稻土	美香粘谷	18.4	69.3	18.3	0.0	0.0	16.7	0.0	1.6	40.4	11.0	正常	0.2	2.1
增城区派潭镇高埔村	淹育型水稻土	美香粘谷	19.1	69.6	18.0	0.5	0.0	16.1	0.0	1.4	41.0	11.7	正常	0.0	1.8

2022年度新收获花生质量调查结果情况表

样品情况			检验结果		
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	纯仁率（%）	含油率（%）	不完善粒（%）
从化区鳌头镇横江村		花生	69.5	49.9	4.7
潮阳区关埠镇圆山村	/	花生	74.9	48.8	3.6
曲江区大塘镇梅花村		小白沙红皮花生	72.7	54.1	1.5
乐昌市廊田镇岩前埂头子村	/	花生	66.4	50.8	4.5
南雄市湖口镇长市村	/	花生	51.5	40.8	3.5
南雄市全安镇古塘村	/	花生	61.6	42.9	11.4
始兴县沈所镇	咸酸型	油油	67.6	46.4	4.6
仁化县扶溪镇古夏村	/	花生1	70.1	43.7	3.7
仁化县扶溪镇后塘村	/	花生2	68.3	41.2	6.2
翁源县江尾镇联益村	渗育型	花生	60.3	41.2	15.3
翁源县龙仙镇丰山村	渗育型	花生	69.1	45.7	5.0
新丰县梅坑镇利坑村	潜育型	白衣花生	63.7	49.3	5.7
乳源县桂头镇均村	咸酸型	白衣花生	71.3	48.6	2.9
龙川县鹤市镇罗乐村	潜育型水稻土	花生	70.5	49.1	4.3
东源县船塘镇龙江村	潜育	花生	60.2	44.7	4.8
和平县彭寨镇墩史村	淹育型水稻土	花生	76.7	44.8	1.9
紫金县龙窝镇双下村	淹育型	花生	74.7	49.1	2.5
紫金县南岭镇庄田村	咸酸型	花生	66.5	46.4	8.1
连平县上坪镇东南村	潜育型	花生	59.0	46.0	2.9
连平县内莞镇横水村	潜育型	花生	55.5	48.9	4.3
五华县转水镇下潭村	潜育型	丰花6号	66.8	50.6	5.8
蕉岭县三圳镇招福村		粤油79	64.2	48.4	6.1
兴宁市叶塘镇上径村		花生	71.2	50.5	4.2
惠东县铁涌镇沙桥村	淹育型	花生	64.9	50.6	4.8

2022年度新收获花生质量调查结果情况表

样品情况			检验结果		
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	纯仁率（%）	含油率（%）	不完善粒（%）
博罗县麻陂镇曲潭1村	/	花生	61.6	46.2	3.7
博罗县麻陂镇曲潭2村	/	花生	65.3	45.7	2.9
龙门县龙江镇龙江村	/	花生	68.3	51.1	2.6
陆丰市城东镇磨海村	/	花生	71.1	43.7	2.6
陆河县河口镇营下村	淹育型	花生	77.7	50.6	10.0
海丰县平东镇平东村	黄土	平东花生	65.2	52.2	8.1
台山市深井镇新蚬滩村	渗育型	花生	60.8	44.8	7.6
开平市马岗镇虎山村	潜育型水稻土	粤油	68.7	47.9	2.8
恩平市君堂镇龙盛村	潜育型	白皮花生	61.7	48.4	6.0
阳西县塘口镇平西村	潜育型	花生	65.5	48.2	6.6
江城区埠场镇那栋村	潜育型	花生（粤油43）	63.5	48.8	1.2
阳春市八甲镇枝根村	潜育型	花生（仲恺花1号）	64.1	48.8	5.1
阳春市八甲镇马四村	潜育型	花生（湛油7号）	64.9	50.6	7.8
阳东区雅韶镇笏朝村	潜育型	花生	62.4	47.5	4.5
雷州市松竹镇方家村	潜育型水稻土	汕油21	59.1	47.0	7.9
雷州市雷高镇雷高村	潜育型水稻土	花生	64.3	47.0	4.7
雷州市雷高镇扶柳村	潜育型水稻土	花生	67.1	47.3	5.5
雷州市杨安镇安榄村	潜育型水稻土	航花2号	70.8	49.6	5.8
雷州市白沙镇新村	潜育型水稻土	汕油21	62.3	47.1	7.7
雷州市南兴镇复仓村	潜育型水稻土	花生	68.8	49.2	7.2
雷州市南兴镇南兴村	潜育型水稻土	花生	72.8	49.0	5.0
徐闻县下桥镇六片田村	渗育型水稻土	花生	62.7	46.9	18.6
徐闻县下桥镇东坑村	渗育型水稻土	花生	65.6	44.3	9.4
徐闻县下桥镇墙塌村	渗育型水稻土	花生	67.5	46.4	2.6

2022年度新收获花生质量调查结果情况表

样品情况			检验结果		
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	纯仁率（%）	含油率（%）	不完善粒（%）
徐闻县迈陈镇打银村	渗育型水稻土	湛油55	72.9	46.4	7.2
徐闻县迈陈镇九亩村	渗育型水稻土	湛油55	65.4	44.9	8.0
徐闻县迈陈镇龙潭村	渗育型水稻土	花生	71.4	45.3	8.5
徐闻县迈陈镇龙马村	渗育型水稻土	花生	64.1	46.1	4.1
徐闻县迈陈镇提塘村	渗育型水稻土	花生	65.5	45.0	9.3
徐闻县迈陈镇峙头村	渗育型水稻土	花生	59.2	44.9	17.1
徐闻县迈陈镇新村仔村	渗育型水稻土	花生	68.2	46.3	11.8
廉江市石岭镇瑶仔村	渗育型水稻土	湛油62	65.4	49.0	7.9
廉江市石岭镇龙飞村	渗育型水稻土	花生	66.6	49.9	7.2
茂南区镇盛镇乌石村	潜育型	红衣花生	61.6	46.8	5.3
茂南区镇盛镇乌石村	潜育型	白衣花生	64.5	52.4	7.8
电白区岭门镇夏蓝村	沙壤土	本地花生	70.1	50.1	4.3
电白区岭门镇夏蓝村	沙壤土	本地花生	71.4	47.0	3.0
电白区马踏镇下河村	沙壤土	本地花生	71.0	51.7	4.3
高州市南塘镇杨岸村	潜育型	常规中豆	64.4	46.7	7.8
高州市谢鸡镇保黎陂头村	潜育型	常规中豆	60.8	45.5	8.7
高州市谢鸡镇保黎陂头村	潜育型	常规中豆	61.7	44.5	9.8
化州市良光镇豺岭村	渗育型水稻土	花生	64.5	47.0	8.1
化州市笄桥镇塘贡村	渗育型水稻土	花生	67.5	46.6	5.4
信宜市池洞镇东南村	潜育型水稻土	花生（红衣）	67.4	42.6	4.5
信宜市合水镇横水村	潜育型水稻土	花生（白衣）	71.8	48.0	5.1
信宜市合水镇新云村	潜育型水稻土	花生（白衣）	69.7	49.6	3.4
德庆县新圩镇历麻村		花生（鲁花9号）	68.6	45.9	4.4
高要区活道镇横石村		花生	67.3	46.7	3.9

2022年度新收获花生质量调查结果情况表

样品情况			检验结果		
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	纯仁率（%）	含油率（%）	不完善粒（%）
怀集县岗坪镇睦渊村	潜育型	花生	67.1	47.9	5.2
怀集县蓝钟镇谭或村	潜育型	花生	70.8	48.9	2.2
四会市迳口市凤凰村	潜育型	花生	66.6	46.6	5.9
四会市迳口市凤凰6号村	潜育型	花生	67.8	50.5	6.2
清新区浸潭镇留良洞村	潜育型	花生	67.2	47.7	6.4
清新区浸潭镇根竹坑村	潜育型	花生	67.7	48.8	4.4
佛冈县迳头镇湖洋村	潜育型	花生	64.2	50.1	7.7
英德市青塘镇建新村	淹育型	花生	64.1	46.5	6.8
英德市东华镇鱼湾村	淹育型	花生	64.5	46.2	6.2
清城区石角镇舟山村	渗育型	花生	70.5	50.8	1.8
清城区石角镇舟山村	渗育型	花生	65.3	47.7	2.9
连州市西岸镇西岸村	潜育型	花生（粤油114）	64.3	44.3	5.9
连州市东陂镇寨江村	潜育型	花生（珍珠豆）	69.4	51.5	2.7
连州市保安镇石梯村	潜育型	花生（白皮）	64.6	48.0	3.1
饶平高堂镇树下村	渗育型	花生（小荚）	67.9	49.0	6.0
揭西县龙潭镇陂尾村	淹育型	红衣	70.0	52.2	2.0
普宁市南径镇四睦村	潜育型、潜育型	花生果	72.4	52.0	6.1
云城区思劳镇三坑村	潜育型水稻土	珠豆花生	66.6	48.9	6.7
云安区镇安镇公安村委南木洲村	潜育型	朱豆花生	69.2	44.1	3.0
罗定市船步镇船北村	潜育型	白沙	64.8	42.2	3.9
新兴县稔村镇布夏村	潜育型水稻土	花生	72.3	39.8	2.3
郁南县东坝镇大坪村	旱地	粤油7号	65.1	46.9	7.8
曲江乌石镇展如村	沙地	小白沙粉皮花生	70.0	52.8	2.3
乐昌市廊田镇农庄下岭村	/	花生	74.2	49.1	1.9

2022年度新收获花生质量调查结果情况表

样品情况			检验结果		
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	纯仁率（%）	含油率（%）	不完善粒（%）
始兴县顿岗镇	咸酸型	粤油花生	71.9	48.2	3.5
紫金县紫城镇石坑村	咸酸型	花生	77.2	46.9	1.2
惠城区水口镇澳背村	/	花生	54.0	40.8	3.3
雷州市雷高镇大群村	潜育型	花生	64.7	48.1	4.5
徐闻县城北乡那种村	渗育型	花生	66.1	47.8	2.8
徐闻县城北乡青铜北村	渗育型	花生	64.1	45.9	1.7
廉江市石岭镇龙山背村	渗育型	湛油62花生	69.1	48.2	4.2
电白区电城镇杨屋村	沙壤土	本地花生	63.8	40.5	11.3
电白区电城镇杨屋村	沙壤土	本地花生	69.3	42.7	5.9
高州区山美镇和坑村	潜育型	粤油3号花生	73.6	48.0	4.7
德庆县官圩镇五福村	/	花生（花育25）	51.6	44.9	4.3
高要区活道镇横石村	/	花生	63.2	46.7	1.7
清新区浸潭镇大树墩村	潜育型	花生	70.5	47.3	8.2
英德市白沙镇车头村	淹育型	花生	70.6	47.1	3.7
惠来县周田镇仙家村	沙质土	花生	63.7	50.1	2.9
罗定市素龙镇凤塘村	潜育型	粤油390（花生）	73.7	45.8	8.9